C. G. Pringle - Plants of Cuba - 1

✓ 1 Triumfetta semitriloba, Jacq.
2
✓ 3 Eupatorium odoratā, L.
✓ 4 Elvira Martyni, Cass.
5
✓ 6 Trixis frutescens, P. Br.
7
8
✓ 9 Priva echinatā, Juss.
✓ 10 Melochia pyramidatā, L.
11 Pachyrrhizus
✓ 12 Gomphrena decumbens, Jacq.
✓ 13 Boerhaavia paniculata, Rich.
14
✓ 15 Rivina humilis, L.
✓ 16 Indigofera tinctoria, L.
✓ 16½ Indigofera tinctoria, L.
✓ 17 Saccharum officinarum, L.
18
19
20
21
✓ 22 Urera baccifera, Gaud.
✓ 23 Piper umbellatum, L.
24
25 Phaseolus lunatus, L.

26 Casearia hirtā, Sw.

27

✓ 28 Polypodium Swartzii, Baker.

✓ 29 Adiantum fragile, Sw.

✓ 30 Sida veronicaefolia, Lam., var. hederaefolia, K. Sch.

31 Unknown

32

✓ 33 Hyptis suaveolens, Poit.

✓ 34 Tephrosia cinerea, Pers.

✓ 35 Petiveria alliacea, L.

✓ 36 Wissadula frostrātā, Planch.

✓ 37 Malvastrum spicatum, Gray.

✓ 38 Dicliptera assurgens, Juss.

39

40 Physalis barbadensis, Jacq., var. obscura, Rydb.

41 Malvastrum spicatum, Griseb.

42 Viguiera helianthoides, HBK.

43

✓ 44 Panicum laxata, Rottb.

✓ 45 Panicum colonum, L.

46 Panicum sanguinale, L.

47 Serjania subdentatā, Juss.

48 Spermacoce

✓ 49 Achyranthes aspera, L.

50 Argemone mexicana, L.

✓ 51 Piper angustifolium, R. & P., var.
✓ 52 Passiflora rubra, L.
53 Phaseolus semierectus, L.
✓ 54 Olyra pauciflora, Sw.
55 Serjania scatens, Radl.
✓ 56 Sida pyramidalā, Cav.
✓ 57 Ipomoea fastigiatā, Sweet.
58 Ipomoea polyanthes, Roem. & Schultes (I. umbellatā, Mey, not: L.)
59 Euphorbia braziliensis, Lam.
✓ 60 Desmodium tortuosum, DC.
✓ 61 Hyptis pectinatā, Poit.
✓ 62 Leptochloa virgata, Beauv.
✓ 63 Desmodium scorpiurus, Desv.
✓ 64 Chamissoa altissima, HBK.
65 Abutilon
✓ 66 Sida angustifolia, Lam.
✓ 67 Sida rhombifolia, L.
✓ 68 Blechum Brownei, Juss.
✓ 69 Nocca mollis, Jacq.
✓ 70 Olyra latifolia, L.
71 Croton lucidus, L.
✓ 72 Argithamnia candicans, Swartz.
✓ 73 Panicum prostratum, Lam.
✓ 74 Panicum fuscum, Sw.
75 Spilanthes

✓ 76 Oplismenus loliaceus, Lam.
✓ 77 Salvia occidentalis, Sw.
✓ 78 Euphorbia filulifera, L.
79 Centrosema pubescens, Benth.
80 Phoradendron quadrangulare, Krug & Urban.
✓ 81 Tragia volubilis, L.
82 Casearia ramiflora, Vahl.
83 Clematis dioica, L. (forma C. havanensis, HBK.)
✓ 84 Trelschia nodiflora, Sw.
✓ 85 Desmodium incanum, DC.
✓ 86 Elaterium carthaginense, Jacq.
87 Psychotria glabrata, Sw.
✓ 88 Adiantum crenatum, Willd.
✓ 89 Adiantum villosum, L.
✓ 90 Villanilla octandra, Hook. f.
✓ 91 Lobelia Cliffortiana, L.
✓ 92 Vernonia mentiaefolia, Less.
93 Trimfetta
✓ 94 Panicum molle, Sw.
✓ 95 Urena sinuata, L.
✓ 96 Chiococca racemosa, L.
✓ 97 Cordia geraschanthoides, HBK.
✓ 98 Rondeletia odorata, Jacq.
99 Gliricidia platycarpa, Griseb.
✓ 100 Rhytidophyllum tomentosum, Mart.

101 Asplenium dentatum, L.
102 Mikania trinitaria, DC.
103 Ruellia macrophylla, Vahl.
104 Sapium laurocerasum, Desf
105 Ginora americana, L.
106 Aspidium rhizophyllum, Sw.
107 Malachra alceifolia, Jacq., var. rotundifolia, Griseb.
108
109 Miconia laevigata, DC.
110
111
112 Amarantus tristis, L
113 Jamia
114
115 Momordica Charantia, L.
116 Waltheria americana, L.
117 Jatropha gossypifolia, L.
118 Croton lobatus, L.
119 Verbesina alata, L.
120
121 Physalis angulata, L.
122
123 Synedrella nodiflora, Gaertn
124
125 Guazuma, ulmifolia, Lam.

6.

✓ Melothria pervaga, Griseb. (no. number)

126 Lauraceae.

✓ 127 Adiantum tenerum, Sw.

✓ 128 Sparganophorum Vaillantii, Crantz.

✓ 129 Polypodium tetragonum, Sw.

130

131 Psychotria rufescens, HBK.

✓ 132 Eclipatera erecta, L.

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Oakes Ames Esqr.
with best wishes
from R. A. Rolfe -

who is really joint author, for Vidal + I prepared the work together when the former was at Kew, except as to the final revision and descriptions of new species at end of work. [Copy].

See also p. 93.

# Phanerogamae Cuneingianae Philippinarum.

D. Sebastian Vidal y Soler,

Manila, 1885.

(Red ink notes are by Wakes Ames).

1. } Helechos (*) En algunas colecciones: #22
427. } 570, 1422; 427 = Murraya sp. (Rutáceas)

430. Cyperus bracteatus, Stend.

431. }
432 } Helechos.

433. Centotheca lappacea, Desv.

436 (**) Desmodium heterophyllum, DC.

437. " ormocarpoides, DC.

438. Indigofera Anil, L.

439. Mollugo stricta, L.

440. Hyptis brevipes, Poit. — 1113.

441. Piper subpeltatum, Willd.

442. Vernonia chinensis, Less.

443. Solanum Melongena, L. (S. Cumingii Dun.)

444. Cyperus distans, L.

445. " diffusus, Vahl. = 533, 534.

446. Cymaria acuminata, Dene.

447. Ceropegia Cumingiana, Dene.

448. Coix Lachryma, L. (C. exaltata Jacq.)

---

(*) Véase "J. Smith Enumeratio filicum Philippinarum, etc." — Hooker Journal of Botany vol. III pág. 392-422."

(**) En algunas colecciones hay bajo este número dos Ciperáceas: Cyperus pennatus Lam. y Cyperus nitidulus, Boeckl.

449. Dalea nigra, Mart. + Galeott.
450. (*) Polygalthia lanceolata, sp. nov.
451. Sida carpinifolia, L. (S. acuta Burm.)
452. Flemingia strobilifera, R. Br.
453. Zizyphus sp. (aff. Z. Baclei Dl.)
454. Mallotus ricinoides, Muell. Arg. = 542.
455. Sauraja exasperata, De Vries.
456. Elatostema longifolium, Wedd.
457. Rubus Fagallus, Cham. = 1851.
458. Wickstraemia ovata, C. A. Mey.
459. Phyllanthus philippinensis, Muell. Arg.
460. Elaeagnus latifolia, L. (E. bumingii Schlecht.) = 1759.
461. Grewia multiflora, Juss. = 701, 1415.
462. Crotalaria verrucosa, L.
463. Bridelia stipularis, Bl.
464. Sphenoclea zeylanica, Gaertn.
465. Blumea grandis, Benth. + Hook. f.
466. Casearia leucolepis, Turcz.
467. Decringia indica, Zoll.
468. Tournefortia sarmentosa, Lam.
469. Urena lobata, L. (Pavonia rubiformis Turcz.)
470. Melochia corchorifolia, L.
471. Ehretia philippinensis, A. DC. = 1484.
472. Sesbania aculeata, Pers.

(*) Ex algarobo herbarios: 400. Harrisonia Bennetii, A. W. Benn. – Simarubeae

473. Morinda bracteata, Roxb.
474. Antidesma Burrius, L. = 1203, 1446.
475. Pithecolobium lobatum, Benth. = 1603, 1854.
476. Voacanga sp. (Orchipeda Bl.)
477. Hygrophila salicifolia, Nees. (H. assurgens Nees) = 992.
478. Moschosma polystachyum, Benth.
479. Nasturtium montanum, Wall.
480. Imperata arundinacea, Cyr. = 931.
481. Clerodendron intermedium, Cham.
482. Asclepias curassavica, L.
483. Toddalia aculeata, Pers (T. effusa, Turcz) = 1010.
484. Polygonum strigosum, R. Br.
485. Piper philippinense, C. DC.
486. Cajanus indicus, Spreng.
487. Emilia sonchifolia, DC.
488. { Cratoxylon floribundum, F. Vill. (Ancistrolobus floribundus, Turcz.) = 492 p., 965, 1221.
Cyrtandra incisa, Clarke = 492 p.
489. Setaria italica, L.
490. Joranthus (Eichlanthus) spicatoides, Bl. = 1970.
491. " " philippinensis, Cham. & Sch. = 1977.
492. { Cratoxylon floribundum, F. Vill. (Ancistrolobus floribundus, Turcz.) = 488 p., 965, 1221.
Cyrtandra incisa, Clarke = 488 p.
493. Panicum radicans, Retz.

494. Oxalis sensitiva, L. (O. cumingiana, Turcz.)
495. Leucas javanica, Benth.
496. Anaxagorea luzonensis, A. Gray = 831
497. Lepidagathis parviflora, Bl.
498. Panicum calaccazense, Steud.
499. Mallotus moluccanus, Muell.-Arg.
500. Graptophyllum hortense, Nees
501. Lunasia amara, Blanco (Rabelaisia philippinensis, Planch.) = {1501 / 1512
502. Pithecolobium subacutum, Benth.
503. Sterculia ferruginea, R. Br.
504. Polyscias nodosa, Seem. = 1053
505. Alstonia macrophylla, Wall. = 782.
506. Isanthera discolor, Maxim.
507. Lupania subundulata, Vid. (Schleichera subundulata, Turcz.)
508. Ipomaea reptans, Poir.
509. Phyllanthus triandrus, Muell.-Arg.
510. Begonia rhombicarpa, A. DC.
511. Averrhoa carambola, L.
512. Mallotus philippinensis, Muell.-Arg. = 1318, 1546.
513. Vitis sp.
514. Tylophora Perrottetiana, Done. (Secamone macrostachya, Turcz.)
515. Elaeocarpus sp. = 1741.
516. Sterculia oblongata, R. Br.
517. Uvaria integrifolia, Cogn. = 767.
518. Psychotria sp. = 1321.

519. Ipomaea pes-tigridis, L.
520. Cananga odorata, Hook. f. & Thoms.
521. Dioclea reflexa, Hook. f.
522. Laportea crenulata, Gaud. var. luzoniensis, Wedd.
523. Pisonia excelsa, Bl.
524. Chloranthus officinalis, Bl.
525. Phacanthus Cumingii, Mig. = 1084.
526. Callicarpa sp.
527. Phyllanthus Cumingii, Muell. Arg.
528. Centipeda orbicularis, Lour. (Myriogine minuta, Less.) = 1264.
529. Leersia hexandra, Sw.
530. Fimbristylis autumnalis, Roem. & Schult.
531. Oplismenus indicus, Nees.
532. Panicum fluitans, L.
533. Cyperus diffusus, Vahl. = 445, 534.
534. " " " = 445, 533.
535. " pilosus, "
536. " ferax, A. Rich.
537. " radiatus, Vahl. var. elongata, Boeckl. (C. macrosciadion, Steud.)
538. Cyperus dilutus, Vahl = 1656.
539. Sapindus Turczaninowii, Vid.
540. Breynia cernua, Muell. Arg. = 1103
541. Roydsia philippinensis, Turcz.
542. Mallotus ricinoides, Muell. Arg. = 454.

543. Melothria indica, Lour.
544. Schizostachyum acutiflorum, Munro
545. Eragrostis tenuissima, Schrad. — 1669.
546. Cyperus compressus, L.
547. Dioscorea myriantha, Kunth.
548. Trianthera Wallichii, F. Vill. (*)
549. Cyperus difformis, L.
550. Cynodon Dactylon, Pers.
551. Setaria glauca, Beauv. = 1342.
552. Kyllinga caespitosa, Nees var. robusta, Boeckl.
553. Panicum neurodes, Schult.
554. " hermafroditum, Stend.
555. Chrysopogon aciculatus, Trin.
556. Leptochloa chinensis, Nees = 825.
557. Cyperus rotundus, L. = 715.
558. Fimbristylis diphylla, Vahl.
559. Cyperus nitens, Vahl.
560. Panicum flavidum, Retz.
561. " sanguinale, L. (P. chrysanthum, Stend.)

---

*) El P. Fernandez Villar (Fl. Fil. Aug. vol. IV, Novisss. Appx. p. 154 y 176) considera como cosa tan distinta: Justicia dichotoma, Bl. (Rhytidoscuta dichotoma, Nees) y Leptostachya Wallichii, Nees, que me parecen idénticas á la primera se refiere el núm. 1471, vol. 4, del Herbario general de Berlin, y á la segunda el mismo del de Kew, no ser así creo que mi sábio amigo hubiera adoptado el nombre específico de [illegible] más antiguo (año 1825) que el de Nees (año 1832) dejando la planta con el de Dianthera dichotoma.

562. Rottboellia exaltata, L. (R. denudata, Steud.)
563. Cyperus diris, L.
564. Fimbristylis miliacea, Vahl. (Trichelostylis miliacea, Nees)
565. Ischaemum rugosum, Salisb.
566. Panicum indicum, L.
567. Laportea Gaudichaudiana, Wedd.
568. Cyperus cylindrostachys, Boeckl.
569. Sorghum halepense, Pers.
570. Panicum colonum, L. (P. Cumingianum, Steud.) 1422.
571. Hemigraphis parabolica, H. Vill. (Ruellia parabolica, Nees)
572. Oldenlandia sp.
573. Mollugo Spergula, L. = 1263.
574. Vandellia hirsuta, Ham.
575. Oldenlandia paniculata, L.
576. Desmodium securiforme, Benth.
577. Ophiorrhiza sp. = 1435.
578. Torenia pedunicularis, Benth.
579. Curanga amara, Juss. = 1442 p., 1444 p.
580. Cleome viscosa, L.
581. Lepidagathis secunda, Nees.
582. Bonnaya reptans, Spr.
583. { Abrus precatorius, L.
{ Panicum amplissimum, Steud.
584. Geophila reniformis, Don.
585. Oldenlandia sp.

586. Hydrocotyle asiatica, L.
587. Spermacoce hispida, L. = 631.
588. Hemigraphis strigosa, A. Vill. (Ruellia strigosa, Nees.)
589. Gymnostachyum Cunninghamianum, Nees.
590. Pouzolzia indica, Gaudich.
591. Hyptis capitata, Jacq.
592. Hedyotis sp.
593. Spilanthes Acmella, L.
594. Bidens pilosa, L. var. bipinnata, Hook. f.
595. Phyllanthus Lanosi, Muell. Arg.
596. Elephantopus spicatus, Juss.
597. Micromelum tephrocarpum, Turcz.
598. Hoya [illegible] Muell. Arg. var. Cunninghamia, Muell. Arg.
599. Premna vestita, Schauer.
600. Leonocephalus ovatus, Trec.
601. Tephrosia purpurea, Pers. = 1257.
602. Maesa indica, A. DC. var. obtusa, A. DC.
603. Hibiscus (Abelmoschus) sp.
604. Tabernaemontana Cunninghamiana, A. DC.
605. Desmodium pulchellum, Benth. = 1808.
606. Leea sambucina, Willd. = 1817
607. " manillensis, Walp.
608. Eranthemum bicolor, Schrank.
609. Sida humilis, Willd.
610. Musaenda sp.

611. Vandellia scabra, Benth.
612. " crustacea, "
613. Achyranthes aspera, L.
614. Abroma fastuosa, R. Br.
615. Ipomaea sp.
616. Clitoria Ternatea, L.
617. Ipomaea, chryseides, Ker.
618. " obscura, " = 1618.
619. Uncaria Hookeri, sp. nov. = 1128.
620. Celosia argentea, L.
621. Acalypha stipulacea, Klotsch.
622. Indigofera hirsuta, L.
623. Urmido madagascariensis, Kunth.
624. Atylosia scarabaeoides, Benth.
625. Elephantopus scaber, L.
626. Homalanthus populifolius, Jam.
627. Polygonum tomentosum, Willd.
628. Elatostema obovatum, Wedd.
629. { " sessile, Forst. var. Brognartiana, Wedd.
" glaucescens, Wedd.
630. Solanum verbascifolium, L. - 1602.
631. Spermacoce hispida, L. = 587.
632. Alisma alismoides, Pers.
633. Tamarindus indica, L.
634. Saccharum spontaneum, L.

635. Apluda mutica, L.
636. Amarantus spinosus, L.
637. Dinochloa Tjankorreh, Buse
638. Morinda umbellata, L. = 1035.
639. Sesamum indicum, L. = 1564.
640. Alloplylus Cobbe, Bl. var. grossedentata Vid. (Schmidelia grossedentata, Turcz.) (*)
641. Strychnos multiflora, Benth. = 695, 1039, 1482.
642. Polygonum barbatum, L. var. barbata, Meisen.
643. Anisomeles ovata, R. Br. = 1878.
644. Ipomoea Turpethum, R. Br.
645. Convolvulus parviflorus, Vahl.
646. Aeschynomene indica, L. = 1370.
647. Crotalaria quinquefolia, L.
648. Symphorema luzoniensis, Vid. (Sycoglea luzoniensis, Turcz.)
649. Solanum nigrum, L. = 1033
650. Pachyrhizus angulatus, Rich. / Ipomoea sp.
651. Triumfetta rhomboidea, Jacq. = 1462.
652. Panicum sarmentosum, Roxb. (P. extensum, Steud.) = 679
653. Barringtonia luzoniensis, Vid. (**) (Botryoropsis luzoniensis, Presl.) = 1268.

---

(*) Me parece que la planta descrita por Turczaninow no es especificamente distinta de Alloplylus Cobbe, Bl.

(**) Fernandez Villar la considera idéntica á Barringtonia acutangula, Gaertn. (l. c. [1862, 86]) la cual creo, siguiendo á Miers (Stravadium), no es especifi-

654. Blechum Brownei, Juss.
655. Jussiaea suffruticosa, L.
656. Psophocarpus tetragonolobus, DC.
657. Cyathula prostrata, Bl.
658. Psilotrichum trichotomum, Bl.
659. Blumea laciniata, DC. = 969, 1757.
660. Cyanotis axillaris, Roem. + Schult.
661. Corchorus acutangulus, Lam.
662. Alysicarpus vaginalis, DC. = 682, sp., 1317.
663. Aleurites moluccana, Willd.
664. Pollia sorzogonensis, Presl.
665. Jussiaea acuminata, Sw. = 1055.
666. Cassia occidentalis, L. = 1450.
667. Arundinella miliacea, Nees.
668. Eragrostis zeylanica, Nees (E. Cumingii, Steud.) = 672, 1104.
669. Mitrasacme alsinoides, R. Br.
670. ?
671. Aristida Cumingiana, Trin.
672. Eragrostis zeylanica, Nees. = 1101
673. Fimbristylis bursifolia, Vid. (*) (Abildgaardia bursifolia, Steud.)
674. Spermacoce stricta, L. f.
675. Fimbristylis acuminata, Vahl. var. minor, Nees.

---

(*) Sigue do á Hasskarl, F. Mueller, Bentham & Hooker etc., incluyo Abildgaardia Vahl. en Fimbristylis Vahl.

summa re distincta.

676. Cyperus cuspidatus, H. B. + Kunth.
677. Osbeckia chinensis, L.
678. Lactuca brevirostris, Thunb.
679. Panicum sarmentosum, Roxb. (P. vacillans, Steud.) = 652.
680. Trichodesma zeylanicum, R. Br.
681. Desmodium laxiflorum, DC.
682. { Alysicarpus vaginalis, DC. = 662, 1517.
{ Pothos longifolius, Presl.
683. Dasycoleum philippinum, Turcz.
684. Macaranga Tanarius, Muell. Arg.
685. Alsodeia Meyeriana, Turcz. (Hemsleya lugonensis, Presl.) = 1112, 1206.
686. Vitex sp. ?
687. Jatropha curcas, L.
688. Mucuna sp. = 954.
690. Solanum ferox, L. = 1529.
689. Canarium Cumingii, Engl.
691. Cissampelos Pareira, L. = 1440, 1613.
692. Convolvulacea indeterminata
693. Premna nauseosa, Blanco = 1353, 1367.
694. Glaoxylon rubescens, Hassk. = 1156.
695. Strychnos multiflora, Benth. = 641, 1059, 1482.
696. Bletia barbata, Sw. (B. longifolia, Steud.)
697. Streptocaulon Baumii, Done. (S. obtusum, Turcz.) = 817, 847, 1562, 1866
698. Anacardium occidentale, L.
699. Polygala chinensis, L.

700. Cratoxylon Blancoi, Bl. = 1777, 1822.
701. Grewia multiflora, Juss. = 1161, 1515.
702. Nymphaea stellata, Willd.
703. Anredera scandens, Moq. (A. cumingii, Haask.)
704. Ancilema nudiflora, R. Br.
705. Oxalis corniculata, L. = 1214.
706. Leonorus sibiricus, L.
707. Cyanotis cristata, Roem. + Sch.
708. Lindenbergia philippensis, Bentl. = 987.
709. Leucas linifolia, Spr.
710. Tribulus cistoides, L. (T. macranthus, Haask.)
711. Spinifex squarrosus, L.
712. Malvastrum tricuspidatum, A. Gray.
713. Eleusine (Dactyloctenium) aegyptiaca, Willd.
714. Eragrostis plumosa, Link.
715. Cyperus rotundus, L. = 537.
716. Eleusine indica, Gaertn.
717. Phyllanthus Niruri, Muell. Arg.
718. Euphorbia pilulifera, L.
719. Acalypha indica, L.
720. Paspalum scrobiculatum, L.
721. Sida h. rhifolia, v. m. retusa, Mast. (S. philippica, Blk.)
722. Fleurya interrupta, Gaud.
723. Heliotropium indicum, L.
724. Pilcurus asper, Wedd. = 1626.

725. Paederia tomentosa, Bl.
726. Pogonatherum saccharoideum, Beauv.
727. Alternanthera denticulata, R. Br.
728. Desmodium umbellatum, DC.
729. Scoparia dulcis, L.
730. Casuarina equisetifolia, Forst. = 863 p.
731. Boehmeria Blumii, Wedd.
732. Desmodium latifolium, DC.
733. Helicteres spicata, Colebr.
734. Orthosiphon stamineus, Benth. var. angustifolia, Benth.
735. Ammannia pentandra, Roxb.
736 Croton Verreauxii, Muell Arg. = 1421.
737. Oxalis sessilis, Ham. (Biophytum Apodiscias, Turez.)
738 Claoxylon sp.
739. " corymbosa, L.
740. Ipomoea digitata, L. (= paniculata, R. Br.; Batatas paniculata, Choisy)
741. Limnophila Roxburghii, G. Don.
742. Hyptis suaveolens, Poit.
743. Colubrina asiatica, Brogn. = 1594, 1838.
744. Gardenia obscura, Vid. (Remigia obscura, Blanco.) = 745.
745. (*) " " , " ( " " , " ) = 744.
746. Glycosmis pentaphylla, Corr. = 1152, 1200.

---

(*) Bajo este número están confundidos en algunos herbarios ejemplares de 740 y 743 ó quizás sea igual á 740 y mezclados 743 y 744 como resulta de la lista de recepcion de Kew.

747. Cassia Tora, L.
748. Abutilon indicum, G. Don.
749. Crotalaria linifolia, L. f.
750. Rubus glomeratus Bl. = 1158, 1837.
751. Uvaria ovalifolia, Bl. = 1901.
752. Rourea heterophylla, Planch.
753. Medinilla myrtiformis, Triana.
754. Osmoxylon sp.
755. Conocephalus acuminatus, Trec.
756. Ulchorrea javensis, Muell. Arg. = 770, 1204, 781.
757. Cyrtandra Cumingii, Clarke.
758. Medinilla astronioides, Triana.
759. Pipturus repandus, Wedd.
760. Memecylon Presliarum, Triana.
761. Aglaia denticulata, Turcz.
762. Calamus sp.
763. Rhoeria Cumingii, F. Vill. (Trymisperum Cumingii Mersen)
764. Macaranga Mappia, Muell. Arg.
765. Hedychium coronarium, Koen.
766. Clematis Gouriana, Roxb.
767. Gynostemma integrifolia, Cogn. — 917.
768. Cyrtolophus macrocephalus, Wedd. — [illegible].
[illegible]. Dimerium lanuriana, Engl.
770. Sideroxylon Duclitan, Blanco = 1895.
771. Flacourtia Jukam, Vill. & Mor. (Aisinara? grandifolia, Turcz.)

772. Aglaia Turczaninowii, C. DC.
773. Mitrephora sp. = 1079, 1135
774. Xylophora sp.
775. Tripliasia trifoliata, DC.
776. Canthium arborcum, Wid. (Ronabea arborea, Blanco)(*) = 1331.
777. Villebrunea trinervis, Wedd.
778. Premna luzoniensis, Schauer = 1280
779. Dioscorea luzonensis, Schauer.
780 Hydrocotyle javanica, Thunb. (H. nepalensis, Hook.)
781. Dioscorea tiliaefolia, Kunth.
782. Alstonia macrophylla, Wall. = 501
783. Michelia sp.
784. Sterculia cuneata, R. Br.
785. Colisanthes? cridepis, Radlk. (fide Fr. Vill.!)
786. { Elatostema rostratum, Miq. var. manilensis, Wed.
{ Vernonia arborea, Ham. = 790 etc.
787. Mischanthus luzonensis, Andr. (Saccharum praegrande, Steud.) 1541.
788. Rubia cordifolia, L.
789. Elatostema podophyllum, Wedd.
790. Vernonia arborea, Ham. = 786 p., 791, 887, 1629.
791. " " = 786 p., 790 etc.
792. Oralia hypoleuca, Presl. = 420.

---

*) Fernandez Villar (l. c. p. 110) identifica este especie con C. rude, Bartl.; pero la nueva descripcion de A. Pde Candolle (Prodr. IV p. 474) no le conviene bien, inflorescencias mucho más cortas etc.

793. Xanthostemon gigantens, F. f. & Vill. = 1684, 1. 46, 1792.
794. Bryfteronia Cumingii, Endl.
795. Canarium gracile, Engl.
796. Semphiandra Cumingiana, F. Vill. (Stenonurus Cumingianus, Miers)
797. Pygeum sp.
798. Mallotus Cumingii, Muell. Arg.
799. Gardenia sp.
800. Heptapleurum caudatum, sp. nov.
Canarium sp. = 649 p. 885.
801. Decastemum Blancoi, sp. nov. (Myrtus communis, Blanco non L.)
802. Medinilla venosa, Bl.
803. Podocarpus cupressina, R. Br.
804. Rhododendron sp.
805. Vaccinium sp.
806 Rubus pectinellus, Maxim.
807. Elaeocarpus Cumingii, Turcz.
808. Rubus Rolfei, sp. nov. (R. chrysophyllus, Vid. non Reinw.)
809. Quercus philippinensis, A. DC.
810. Hedyotis sp.
811. Cryptandra oblongifolia, Clarke (Mitreia oblongifolia, Bl.)
812. Hoya sp.
813. Aeschynanthus philippinensis, Clarke.
814. Heptapleurum sp.
815. Dissochaeta sp.
816. Clerodendron brachyanthum, Schauer.

817. Streptocaulon Baumii, Done. = 697, 847, 1562, 1865.
818. Cryptolepis sp.
819. Tumbaria Cumingiana, Benth.
820. Vitis sp. (aff. Cissus pubescens, Bl.)
821. Decaspermum paniculatum, Kurz. = 1824.
822. Blusocheton tetrapetalus, Turcz.
823. Epithema Brunonis, Done. var. fasciculata, Clarke.
824. Rhyncoglossum lehugioides, Clarke.
825. Leptochloa chinensis, Nees. = 556.
826. Allophilus cobbe, Bl. = 1502, 1569.
827. Polyalthia sp.
828. Goniania microcarpa, DC. = 973, 1078, 1623.
829. Myristica bracteata, A. DC. var. longifolia, A. DC.
830. Jasminum crassifolium, Bl.
831. Ochaxagorea luzonensis, A. Gray = 1476.
832 Vaccinium sp.
833. Nauclea Cumingiana, sp. nov. = 1522.
834. Piper rhombophyllum, C. DC.
835. Nauclea gracilis, sp. nov.
836. Medinilla Cumingii, Naud.
837. Solanum Blumei, Nees.
838. Fagraea plumeriaefolia, A. DC.
839. Freycinetia strobilacea, Gaud. ?
840. Salacia sp.
841. Piper miniatum, Bl. = 1708.

= Polycodium Cumingianum, C. DC.
843. Paederia sp.
844. Myristica corticosa, Hook. f. & Th. = 1304.
845. Desmodium polycarpum, DC.
846. Eugenia (Jambos.) cinnamomea, sp. nov.
847. Streptocaulon Baumii, Merr. = 697, 917, 1562, 1563.
848. Strombosia philippinensis Vid. (Curtisia philippinensis, Zoll.)
849. { Canarium, sp. = 800 p., 885.
{ Pimelandra disticha, F. Vill. (Antisia disticha, A. Gr.)
850. Astronia papetaria, Bl. ?
851. Connarus Rolfei, Vid. (Anisostemon trifoliatus, Turcz.) (*)
852. Randia sp.
853. Melastoma molle, Wall.
854. Crossea Cumingiana, sp. nov. = 1112.
855. Clethra canescens, Reinw. (C. lanceifolia, Turcz.) = 321.
856. Begonia Cumingiana, C. DC.
857. Drosera spathulata, Labill.
858. Helicia loranthoides, Presl.
859. Alpinia sp.
860. Aporosa microcalyx, Hassk. var. cuneata, Müll. Arg. = 1724.
861. Eugenia (Syzygium) sp. = 1825.
862. Uncaria florida, sp. nov. = 898, 1504.

---

(*) Distinto segun Rolfe (in litt.) de 1463. b. polyanthus; Schuch (V. F. Vill. l. c. p. 56.)

863. { Casuarina equisetifolia, Forst. = 730.
Aglaonema Haenkei, Schott.
864. Geniostoma Cumingiana, Benth.
865. Webera Cumingiana, sp. nov.
866. Wattheria indica, L.
867. Kennedya maritima, Gibl.
868. Myrsine capitellata, Wall. = 1601.
869. Vitis adnata, Wall. = 1401, 1494.
870. Gironniera celtidifolia, Gaud.
871. Croton Tiglium, L. = 1804.
872. Torenia polygonoides, Benth.
873. Elaeocarpus multiflorus, Vill. (Monocera multiflora, Turcz.)
874. Villaria littoralis, sp. nov.
875. Stenomeris dioscoreaefolia, Planch.
876. Hoya sp.
877. Colubrina serratifolia, Vid. = 1660, 1553.
878. Nauclea sp.
879. Hopea philippinensis, Dyer.
880. Shorea furfuracea, Miq.
881. Dipterocarpus Hasseltii, Bl.
882. Unisoptera lanceolata, Dyer (Anisoptera lanceolata, Turcz.)
883. Shorea smaragdina, Dyer (Hopea smaragdina, Turcz.) = 1552.
884. " Balangeran, Dyer.
885. Canarium sp. = 800 p., 849 p.
886. Canthium Vidalii, sp. nov. (C. umbellatum, Fr. Vid. non all.) =
1527.

887. Vernonia arborea, Ham. = 786 p., 790, 791, 1629.
888. Eugenia (Jambosa) sp.
889. Memecylon paniculatum, Jack.
890. Nauclea Blancoi, sp. nov. (Nauclea glabra, Blanco non DC.)
891. Nonnandra laxiflora Vid. (Platea laxiflora, Miers.)
892. Shorea squamata, Dyer. (Hopea squamata, Turcz.) = 883.
893. Elaeocarpus oblongus, Gaertn.
894. Sindora reticulata, F. Vill. (Pterula reticulata, Bl.)
895. Ixora Cumingiana, sp. nov. = 1233, 1566.
896. Ixora sp.
897. Paederia verticillata, Bl.
898. Uncaria florida, sp. nov. 862 1501.
899. Fluggea obovata, Wall. = 1169.
900. Antidesma pleuricum, Tul.
901. Myristica paniculata, A. DC.
902. Aglaia macrobotrys, Turcz.
903. Myristica sp.
904. Canarium ovatum, Engl.
905. Vaccinium sp.
Justicia Gendarussa, L. = 1043, 1640.
906. Agatis lorentzifolia, Salisb. (Dammara Rumphii, Presl.)
907. Agelaea sp.
908. Pothos inaequilaterus, Presl. (P. Cumingiana, Schott.)
909. Evodia Roxburghiana, Benth. = 1145.
910. Microchites Schrieckii, Vid. (Ecdysanthera Schrieckii, Mull. Arg.)

911. Callicarpa erioclona, Schauer.
912 Piper philippinum, Mio.
913. Eugenia (Syzygium) sp.
914. Pothos cylindricus, Presl.
915. Caryota sp.
916. Ormosia calavensis, Blanco = 1219.
917 Memecylon cumingianum, Presl.
918. Mussaenda anisophylla, sp. nov.
919. Paratrophis philippinensis, Fr. Vill. (Pronorus philippinensis, Bur.)
920. Aralia hypoleuca, Presl. = 792.
921. Clethra canescens, Reinw. = 855.
922. Saurauja rugosa, Turcz.
923. Hoya multiflora, Blume
924. Ixora ramiboicia, Vid. (*Hesperia ramiboides, Blanco).
925. Eugenia (Syzygium) cumingiana, sp. nov.
926. Ixora sarmentosa, Vb. (I. affinis, Turcz.) = 1638.
927. Melastoma obvolutum, Jack.
928. Otanthera crinita, Naud.
929. Diarella crispifolia, Red.
930. Reifferschiedia speciosa, Presl.
931. Inflorata arundinacea, Lour. = 450.
932. Clarisia (Bauhinia) sp.
933. Eurya japonica, Thumb.
934. Gaultheria cumingiana, sp. nov.

(*) S. Vidal. Contálogo sinotódico Phanerogamas Provincia Manila (925.) Madrid 1886.

935. Vaccinium sp.
936. Carex bengalensis, Kork var. scaberrima, Boeckl.
937. Hedyotis sp.
938. Dichrotrichium chorisepalum, Clarke.
939. Gymnema sp.
940. Fagraea morindaefolia, Bl. = 1506, 1814.
941 Aspidopteryx sp. = 745 p.
942. Adenosacme longifolia, Wall.
943 Nertera sp.
944. Sauraja latebracteata, Choisy (S. bumingiana, De Vries) 1552.
945. Spathelobus garcinifolius, Roxb.
{Aspidopteryx sp. = 941
946. Isachne Myosotis, Nees.
947. Nepenthes ventricosa, Blanco.
948. Grangea maderaspatana, Poir.
949. Rourea multiflora Planch. = 1172.
950. Maranthes corymbosa, Blume = 1637.
951. Ernestia ramiflora, Griff.
952. Erioglossum edule, Bl. 1206.
953. Acacia pennata, Willd.
954. Mucuna sp.
955. Caesalpinia bonduc, Roxb.
956. Pinus insularis, Endl.
957. Caesalpinia sepiaria, Roxb.
958. Eugenia (Syzygium) sp.

959. Connarus obtusifolius, Planch.
960. Garuga mollis, Turcz. = 1235.
961. Crataeva religiosa, Forst.
962. Pterocaulon cylindrostachyum, Clarke (Monenteles spicatus, Labill.)
963. Monochoria vaginalis, Presl. = 964.
964. " " , " = 963.
965. Cratoxylon floribundum, H. Bill. (Cnestis floribunda, Turcz.) = 488 p., 492, 1221.
966. Antidesma rostratum, Tul. = 1246, 1316.
967. Pterospermum diversifolium, Bl. = 1052, 1524.
968. Cassia timoriensis, DC.
969. Blumea laciniata, DC.
970. Ochtabotrys Cumingiana, sp. nov.
971. Hiptage Madablota, Guertn.
972. Sinoëcia Cumingiana, sp. nov.
973. Souania microcarpa, DC. = 828, 1578, 1623.
974. Oldenlandia Horneriana, Miq.
975. Vernonia sp. (aff. V. arborea, Ham.)
976. Stachytarpha muricata, Lindl.
977. Polygala telephioides, Willd.
978. Buchnera urticifolia, R. Br.
979. Loureira bracteata, Vesq.
980. Rhynchotechum villosum, Jack. = 1397.
981. Nepenthes chrysanthemus, F. Muell.
982. Baccaurea tetrandra, Muell.-Arg.

983. Maesa indica, A. DC. var. Wightiana, (A. DC.).
984. Crotalaria albida, Heyne.
985. Indigofera trifoliata, L.
986. Antidesma Thwaitesianum, Gaertn., var. reticulata, Muell. Arg. = 1656.
987. Brucea sumatrana, Roxb.
988. Saggera alata, Schultz (Conyza tetraptera, Turcz.; Blumea tetraptera, Rolfe).
989. Lindenbergia philippinensis, Benth. = 1108.
990. Alchornea javensis, Muell. Arg. = 756, 1204, 1511.
991. Atalantia nitida, Oliv. (Sclerostylis nitida, Turcz.) = 1548.
992. Ixora calycifolia, Wall. (I. assurgens, Wall.) = 1107.
993. Blumea balsamifera, DC.
994. Salacia sp.
995. Coldenia procumbens, L.
996. Stereospermum Seemannii, Rolfe.
997. Vitex sp.
998. Croton leiophyllus, Muell. Arg. = 1075.
999. Astronia Cumingiana, Sp. nov.
1000. Andropogon Nardus, L.
1001. Embelia philippinensis, A. DC. = 1129.
1002. Spodiopogon angustifolius, Trin. (Andropogon convolutus, Steud.)
1003. Heteropogon contortus, Roem. (Stereospermum gracilimatum, Merr. (Tecomanthe macrophylla, Blanco).
1004. Terminalia mollis, Bl. (Pentaltera mollis, Presl.)
1005. Commersonia platyphylla, Andr. = 1533.

1006. Canarium muniti florum, Engl.
1007. Azima nova, Blanco (A. tetracantha, F. Vill. non Lam.; A. sarmentosa, F. Vill.)
1008. Hearnia cumingiana, D.C.
1009. Crotalaria bracteata, Roxb.
1010. Podalia aculeata, Pers. (P. Camvijua, Turcz.) = 1356.
1011. Casearia cinerea, Turcz. = 1256.
1012. Cordia cumingiana, nov. sp.
1013. Spiddagathis fasilanthia, Nees.
1014. Atylosia mollis, Benth.
1015. Hypoestes cumingiana, F. Vill. (Peristrophe cumingiana, Nees.)
1016. Hemigraphis rhytidophylla, F. Vill. (Ruellia rhytidophylla, Turcz.)
1017. Cudrania obovata, Trec.
1018. Pisonia aculeata, L. = 1064, 1909.
1019. Hypoestes laxiflora, Nees.
1020. Mikania scandens, Willd.
1021. Alophylus cobbe, Bl. var. Blancoi, F. Vill. (A. Blancoi, Naves) = 1270 1147
1022. Prosperminum obliquum, Blanco (P. Sczegleria, Turcz.)
1023. Blumea virens, D.C. = 1920 p.
1024. Strobilocalon cumingii, F. Vill. (Tristolepis cumingii, Turcz.)
1025. Gnaphalium luteo-album, L. = 1459.
1026. Argyreia tiliaefolia, Wight. = 1087.
1027. Caraffia integerrima, D.C. = 1066.
1028. Cassia nodosa, Ham.
1029. Jasminum luzoniense, sp. nov.

1030. Ipomaea reniformis, Choisy.
1031. Securidaca corymbosa, Turcz. (S. Cumingii, Hassk.).
1032. Odina speciosa, Bl.
1033. Solanum nigrum, L. = 649.
1034. Buddleia asiatica, Lour. = 1902.
1035. Morinda umbellata, L. = 638.
1036. Rotonia litoralis, Ten. fil. (Ardisia litoralis, Sm.) = 1170.
1037. Ardisia spiralis, Ten.
1038. Blumea glomerata, DC.
1039. Terminalia pellucida, Presl.
1040. Melinis tirta, Nimm.
1041. Hernandia peltata, Meissn. = 1577.
1042. Myristica sp.
1043. Justicia Gendarussa, L. = 905, 1640.
1044. Piper corylistachyon, C. DC.
1045. Pothos luzonensis, Schott.
1046. Eugenia (Syzygium) sp.
1047. Calophyllum Pseudo-Tacamahaca, Planch. & Tr.
1048. Alphitonia moluccana, Teism. & Binn.
1049. Eugenia (Syzygium) sp.
1050. Pittosporum brachysepalum, Turcz. = 1127.
1051. Polyalthia suberosa, Hook. f. & Th. = 1191.
1052. Pterospermum diversifolium, Bl. = 767, 1524
1053. Polyscias nodosa, Seem. = 504.
1054. Sympliocos oblongifolia, id. (Carlea oblongifolia, Wall.)

1055. Jussiaea acuminata, Sw. = 665.
1056. Tricromulum mollis, Turcz.
1057. Turnarium salicifolium, Mig. (Turnera salicifolia, Presl.)
1058. Borgia pondulosa, Turc..
1059. Struthanthus multiflorus, Benth. = 641, 685, 1482.
1060. Dracaena terminalis, L. fil. = 1071.
1061. Scolopia lanceolata, Clos.
1062. Mangifera indica, L.
1063. Thespesia campylosiphon, Kurz (Hibiscus campylosiphon, Turcz.)
1064. Pisonia aculeata, L. = 1018, 1107.
1065. Parsonsia sp.
1066. Carallia integerrima, Clarke = 1074
1067. Ardisia Perrottetiana, A. DC.
1068. Capparis horrida, L. fil. = 1085
1069. Delima sarmentosa, L. var. hebecarpa, Hook. f.
1070. Ixora sp.
1071. Erycibe sp.
1072. Litsaea chinensis, Lam. var. multiflora, Meissn. = 1226.
1073. Artocarpus grandifolius, Blanco.
1074. Leea fasciculata, Ridl. (Pentaloba fasciculata, Turcz.)
1075. Croton laciophyllus, Muell. Arg. = 798.
1076. Streblus asper, Lour.
1077. Calophyllum Cumingii, Planch. & Tr.
1078. Artocarpus nitida, Trec. = 1081.
1079. Mitrephora sp. = 773, 1135.

1080. Rungia diversiformis, Nees.
1081. Artocarpus nitida, Trec. = 1078.
1082. Timonius sp.
1083. Ebermaiera Teesii; id. (E. spatulata, Nees non Hassk.)
Limnophila punctata, Benth. = 1216, 1461.
1084. Phaeanthus Cumingii, Miq. = 525.
1085. Caspiaris horrida, L. f. = 1068.
1086. Dischidia sp.
1087. Argyreia tiliaefolia, Wight = 1026.
1088. Uvaria sp.
1089. Gelonium glomerulatum, Hassk. = 1167.
1090. Mallotus repandus, Muell. Arg. = 1098.
1091. Salacia prinoides, DC. = 1060.
1092. Vernonia philippinensis, Rolfe
1093. Eugenia Jambolana, Lam.
1094. Hibiscus (Abelmoschus) sp.
1095. Callicarpa sp.
1096. Clerodendron fragrans, L.
" philippinum, Schauer (fide Schauer!)
1097. Pogostemon velatus, Benth.
1098. Mallotus repandus, Muell. Arg. = 1090.
1099. Artabotrys hamata, BL.? 1179, 1818.
1100. Macaranga Cumingii, Muell. Arg.
1101. Pollinia setifolia, Nees (Andropogon asthenostachys, Steud.)
1102. Wendlandia luzonensis, DC. = 1640, 1869.

1103. Breynia cernua, Muell. Arg. = 540.
1104. Eragrostis zeylanica, Nees (E. cumingii, Steud.) - 668, 672.
1105. Hibiscus surattensis, L.
1106. Zornia diphylla, Pers.
1107. Canscora diffusa, R. Br.
1108. Sageretia theezans, Brogn.
1109. Homalium bracteatum, Benth.
1110. Hemimyia connesta, Roxb.
1111. Malachra lineariloba, Turcz.
1112. Illigera luzoniana, Turcz. (Heuschelia luzonensis, Presl.) = 685, 1306.
1113. Hyptis brevipes, Poir. — 440.
1114. Pistia Stratiotes, L. = 1136 p.
1115. Buchanania florida, Schauer var. cumingii, Engl.
1116. Sandoricum indicum, Car.
1117. Utricularia heterosepala, Benj.
1118. Salomonia oblongifolia, DC. (S. ramosissima, Turcz.)
1119. Bauhinia sp.
1120. Engelhardtia spicata, BL. (E. philippinensis, C. B. C.) 1290.
1121. Aganosma marginata, G. Don. (A. acuminata, G. Don.)
1122. Combretum sycamosum, Roxb.
1123. Xylosma cumingii, Clos. = 1250.
1124. Garcinia vernulosa, Choisy.
1125. Buchanania microphylla, Engl.
1126. Ficus ficaria philippinensis, Radl. = 1870 p.
1127. Ficus pisifera, Blanco (Cfr. Ficus laurifolia, F. Vill. non-Hirn, + F. nigrescens, F. Vill.)

1128. Uncaria Hookeri, sp. nov. = 619.
1129. Champereia Griffithii, Planch.
1130. Ehretia sp.
1131. Nephelium Longana, Camb. (Sapindus cinereus, Burg.) = 1104.
1132. Olax imbricata, Roxb.
1133. Rauwolfia amsoniaefolia, Dc. = 1249.
1134. Cynometra sp.
1135. Mitrephora sp. = 773, 1079.
1136. Croton luzonensis, Muell.-Arg.
Pistia Stratiotes, L. = 1114.
1137. Glaoxylon rubescens, Miq. var. Meyeniana, Muell.-Arg.
1138. Caesalpinia Nuga, Ait.
1139. Blumea Wightiana, Dc.
1140. Pupalia atropurpurea, Moq.
1141. Lelidogathis mucronata, Nees. = 1148.
1142. Diospyros philippinensis, A. Dc.
1143. Sterculia stipularis, R. Br.
1144. Vitex littoralis, Decne. non A. Cunn. (V. timoriensis, Warb. = 1363 1830.
1145. Dysoxylum Burgerianum, C. Dc. (Hartighsea sp., Burg.)
1146. Semecarpus philippinensis, Engl.
1147. Sideroxylon [illegible], R. Br. (Bassia [illegible], A. Dc.).
1148. Lepidagathis mucronata, Nees. = 1141.
1149. Psoralea adocana, Blanco. = 1044.
1150. Harrisonia Bennettii, A. W. [illegible] var. [illegible].
1151. Memecylon sp.

1152. Glycosmis pentaphylla, Corr. (Clarignia nitida, Turcz.) = 116, 1200.
1153. Abutilon auritum, G. Don. (Sida aurita, Wall.)
1154. Spilanthes grandiflora, Turcz.
1155. Ardisia bumingiana, A. DC.
1156. Glaoxylon rubescens, Muell. Arg. = 694.
1157. Modecca sp.
1158. Rubus glomeratus, Bl. = 750, 1837.
1159. Acalypha grandis, Benth. var. velutina, Muell. Arg.
1160. Stephania hernandifolia, Walp. = 1533.
1161. Erythrina lithosperma, Bl.
1162. Derris multiflora, Benth. var. longifolia, Benth.
1163. Pterosperm[illegible] sp.
1164. Dalbergia polyphylla Benth.
1165. Ballicarpa micrantha, sp. nov.
1166. Acacia concinna, Benth.
1167. Gelonium glomerulatum, Hassk. = 1089.
1168. Ardisia humilis, Vahl.
1169. { Ratonia lachnopetala, Turcz. (Lachnopetalum glabrum, Turcz.)
{ Fluggea obovata, Wall. = 599.
1170. Ratonia littoralis, F. Vill. (Urytera litoralis, Kurz.) = 1536.
1171. { Phaleria cumicata, Muell. Arg.
{ Conarus obliquus, Wall. (Cnestis obliqua, Presl.)
1172. Rourea multiflora, Planch. = 747.
1173. { Vitex sp.
{ Vitis bumingiana, Turcz.

1174. Bischofia javanica, Bl. = 1185 p. ?
1175. Litsea chinensis, Lam. var. Jacquini, Meissn.
1176. Rhododendron paniculatum, D. Don.
1177. Scolopia crenata, Clos. (Phoberos crenatus, Hook. f. (Arn.) = 1510 1. 91.
1178. Phyllanthus distichus, Muell. Arg.
1179. Calophyllum falcatum, Bl.
1180. Eugenia sp.
1181. Bauhinia sp.
1182. Stereospermum Banaibanai, Rolfe.
1183. Nelumbium speciosum, Willd.
1184. Ehretia sp.
1185. Sterculia foetida, L. (*).
1186. Eugenia (Syzygium) sp.
1187. Pycnarrhena gigantea, Diels.
1188. Lagerstroemia paniculata, Vid. (Sterocalyptra paniculata, Turcz.)
1189. Nymphaea lotus, L.
1190. Piper Cumingianum, Miq. = 1624.
1191. Polyalthia suberosa, Hook. f. & Th. = 1651.
1192. Chailletia Lenticularis, Turcz.
1193. Mezoneurum glabrum, Desf.
1194. Phyllanthus diversifolius, Muell. Arg. = 1591.
1195. Exocarpus latifolia, R. Br. (E. luzonensis, Presl.)
1196. Melia Candollei, A. Juss.
1197. Guigualis indica, L.

(*) Jean Muel. Arg. (Prodr. XV p. 463.) Bischofia javanica Bl. (Euphorbiaceae)

1198. Saccodetalum sp
1199. Illaenthus luzonicus, F. Vill. (Thorus luzonica, Blanco) = 1148
1200. Glycosmis pentaphylla, Corr. = 146, 1152.
1201. Glycosmis luzonensis, Turcz.
1202. Cordia sp.
1203. Antidesma Burmius, L. = 474, 1446.
1204. Alchornea javensis, Rudl. Lam. = 76, 119, 1181.
1205. Terminalid Catappa, L.
1206. Erioglossum edule, Bl. = 952.
1207. Indigofera tinctoria, L.
1208. Ficus Cumingii, Miq.
1209 Cunstrus paniculata, Willd.
1210. Calpuris floribunda, Wight.
1211 Casimiroa sp.
1212. Calophyllum amplexicaule, Choisy.
1213. Ligustrum Cumingianum, Decne.
1214. Opalis corniculata, L. = 705.
1215. Tournefortia Forsterii, Miq.
1216. Limnophila punctata, Bl. = 1083 p., 1461.
1217. Inserium reperus, L.
1218. Zanthoxylum sp. = 1356.
Triphanthus Cumingii, A. DC. = 1228.
1219. Crinosia calavensis, Blanco = 916.
1220. Upenthus alata, Blanco = 1337, 1682, 1812.
1221. Cratoxylon floribundum, F. Vill. (Cnicistolobus floribundus, Turcz.) = 488 p., 492 p., 965

1222. Leea sp.
1223. Albizzia retusa, Benth. = 1273.
1224. Triticum vulgare, Vill.
1225. Calamus pariifolius, Roxb.?
1226. Litsaea chinensis, Lam., var. multiflora, Meissn. = 1072.
1227. Pterocarpus indicus, Willd.
1228 Strophanthus cumingii, A. DC. = 1218 p.
1229. Alstonia scholaris, R. Br.
1230. Premna adenosticta, Schauer.
1231. Elretia sp.
1232. Trema amboinensis, Bl. = 1671.
1233. Ixora cumingiana, sp. nov. = 812, 966.
1234. Casparis sp.
1235. Garuga mollis, Turcz. = 960.
1236. Webera sp.
1237. Eutaxia verrucosa, Bl.
1238 Glycine tomentosa, Benth.
1239. Glossogyne tricuspidata, F. Vill. Bidens tricuspidata, Turcz.)
1240. Casearia sp.
1241. Ilex cumingiana, Rolfe.
1242. Morinda cumingiana, sp. nov.
1243. Sideroxylon attenuatum, A. DC.
1244. Dalbergia cumingiana, Benth.
1245. Sarcocephalus cordatus, Miq. = 1530.
1246. Antidesma rostratum, Tul. var. barbata, Muell. Arg. = 766.

1247. Aristolochia sp.
1248. Piper officinarum, C. DC.
1249. Rauwolfia amsoniaefolia, A. DC. = 1133.
1250. Xylosma buxifolii, Clos. = 1123.
1251. Eugenia (Jambosa.) sp.
1252. Linociera cuspidata, Hook. f. & Th.
1253. Rhodomyrtus tomentosa, Hassk. (Myrtus tomentosa, Ait.)
1254. Eurya umbellata, Rottb.
1255. Heleocharis plantaginea, R. Br.
1256. Baccaria cinerea, Turcz. = 1011.
1257. Tephrosia purpurea, Pers. = 601.
1258. Crotalaria sessiliflora, L.
1259. Zornia Gouveirii, Tenore.
1260. Entada scandens, Benth. = 1692.
1261. Mimosa pudica, L. = 1372.
1262. Helicia cumingiana, Presl.
1263. Mollugo Spergula, L. = 573.
1264. Lecanthes peduncularis, Gaud. (Urtica pedunculata, Forst. f. = 598.
1265. Epithema Benthami, Clarke.
1266. Callicarpa magna, Schauer.
1267. Trichilia sp.
1268. Barringtonia racemosa, Vill. (Barringtonia racemosa Presl.) = 653.
1269. Harpullia Blancoi, F. Vill. (*) = 1581.

(*) Enum. Filip. Aug. vol. IV. Mercado Libr. Medic. p. 4. identificada por el mismo autor con Novoss. Cupheud. n. 53 con H. cupanioides Roxb. de la cual es distinta.

1269. Ulloa, Aculeata Cooke, Bl. var. Blancoi, K. Hill. = 1021, 1117.
1271. Villaria Rolfei, sp. nov.
1272. Anthistiria arundinacea Hook. (Scrobachne secunda, Presl.) 1607.
1273. Untaurea scandens, Benth.
1274. Panicum auritum, Presl. = 1880.
1275. Eugenia (Syzygium) sp.
1276. Xungia longistia, Merr.
1277. Cropithea sp.
1278. Aglaia oligantha, C. DC.
1279. Wrightia lovata, A. DC. = 1802.
1280. Premna cumingiana, Schauer. = 778.
1281. Centranthera hispida, R. Br.
1282. Portulaca sp.
1283. Callicarpa cana, L.
1284. Secamone multiflora, Decne.
1285. Citrus medica, L. (C. notissima, Blanco)
1286. Linospora reticulata, Miers.
1287. Thumbergia fragrans, Roxb.
1288. Bonnaya veronicaefolia, Spreng. (B. grandiflora, Spreng.) meinu.)
1289. Polygonum plebeium, R. Br. (P. Roxburghii, Meisn., var. spathulata.
1290. Engelhardtia spicata, Bl. = 1120.
1291. Maria mira, Bl. = 1402, 1589, 1807.
1292. Hepatapleurum, sp.
1293. Wrightia sp.
1294. Vitex sp.

1295. Knoxia corymbosa, Willd.
1296. Eugenia (Syzygium) sp.
1297. Leptonetra macquifolia, A. Gray.
1298. Justicia procumbens, L.
1299. Eugenia (Jambosa) sp.
1300. Antidesma Cumingii, Muell. Arg. = 1554.
1301. Macaranga bicolor, Muell. Arg.
1302. Xanthia hitebracteata, Choisy (S. Cumingiana, K. Vries) = 7114.
1303. Weberа sp.
1304. Trigonachras cultrata, Radl. (Sapindus? cultratus, Turcz.)
1305. Syzygium sp.
1306. Alyxia Cumingiana, Kuntz. (Alyxia Cumingiana, Presl.) 683, 1112.
1307. Aglaia sp.
1308. Eugenia (Syzygium) sp.
1309. Musticia corticosa, Hook. f. & Th.
1310. Rubiacea Cumingiana, A. DC. (Randia Cumingiana, Fleer.)
1311. Ophiorrhiza Philippinensis, Planch.
1312. Amomum sp.
1313. Milletia sp.
1314. Malaisia tortuosa Blanco = 1772.
1315. Randia sp.
1316. Antidesma rostratum, Tul. var. ternifolium, Muell. Arg.
1317. Illigera cauliflora, Bl. = 662, 662 b.
1318. Mallotus philippinensis, Muell. Arg. = 512, 1546.
1319. Premna tiliaefolia, Vahl.

1320. Melochia arborea, Blanco.
1321. Psychotria sp. = 518.
1322. Pavetta sp.
1323. Webera luzoniensis, sp. nov.
1324. Celastrus polybotrys, Turcz.
1325. Eugenia (Syzygium) sp.
1326. Ternstroemia [illegible] Presl.
1327. Ilysanthes parviflora, Rolfe (Anonymus parviflorus, Pres.)
1328. Cyrtandra auriculata, Clarke.
1329. Engelhardtia parviflora, C. DC.
1330 Callicarpa lanceifolia, Lam. var. subglobrata, Schauer.
1331. Kaempferia sp.
1332. Alsodeiopsis [illegible], Bl. (*)
1333. Medinilla Lagunae, Vid. (*)
1334. Pergularia accedens, Bl.
1336. Asporaca filicaulis, Bl.
1335. " Guamoclit, Lo.
1337. Nepenthes alata Blanco = 1220, 1682, 1812.
1338. Desmodium gyrans, DC. = 1619.
1339. Spiraea [illegible] Presl. (Cuneata, Pres.)
1340. Heliotropium strigosum, Willd.
1341. Cynoglossum micranthum, Desf.

(*) [illegible] "Vidalia racemosa" (p. 51) cita en Medinilla bracteata, Bl. Cumm. 1487 (hoja errata tipográfica; en Moluccis et sylvis Novae Guineae) 1487 lo es; pero 1333 (err. 1335) distinta.

1342. Setaria glauca, Beauv. = 551.
1343. Piper Pseudo-lhavica, C.DC.
1344. Dissochaeta Cumingii, Naud.
1345. Viburnum luzonicum, Rolfe.
1346. Polyalthia sp.
1347. Salvia plebeia, R.Br.
1348. Antidesma montanum, Bl.
1349. Eupatorium Lindleyanum, DC.
1350. [illegible] capitellata, Vieil. [illegible], 1842.
1351. Sageretkia orientalis, Brongn. (Microrhamnus pterophylla, Turcz.)
1352. (*) Grewia sp.
1353. Premna nauseosa, Blanco = 693, 1367.
1354. Antidesma Cumingii, Muell. Arg. = 1300.
1355. Murraya crenulata, Oliv.
1356. Xanthoxylum sp. = 1218 p.
1357. Orthosiphon stamineus, Benth.
1358. Ficus [illegible], L.
1359. Strigа luzuria, Benth. (Buchnera luzuria, Hance.)
1360. Striga lutea, Lour.
1361. Vernonia cinerea, Less. = 1625 p.
1362. [illegible], Lour.
1363. Javicum semialatum, H.Br. (Solosteum multiflorum, Stud.) = 1414.
1364. Phyllanthus bidiformis, Muell. Arg.
1365. Vitex littoralis, Turcz. = 1244, 1850.

(*) En algunos herbarios mezclado bajo este número el 1262.

1366. Randia cumingiana, sp. nov.
1367. Premna nauseosa, Blanco = 693, 1353.
1368. Mussaenda sp (aff. M. grandiflora, Wolfe)
1369. Cassia mimosoides, L.
1370. Aeschynomene indica, L. = 646.
1371. Eriosema chinense, Vog.
1372. Mimosa pudica, L. = 1261.
1373. Ebermaiera debilis, Anders.
1374. Hibiscus (Abelmoschus) sp.
1375. Glossocarpus ternifolia, Cas. (Trideris denudata, Turcz.)
1376. Cryptocoria glabra, Bl.
1377. Poligonum lanigerum, R. Br. var. indica, Meisn.
1378. Miquelia cumingii, Baill.
1379. Lasia cumingii, Clarke.
1380. Uvaria purpurea, Bl.
1381. Potamogeton lucens, L.
1382. Crinum cumingii, Bak.
1383. Globba marantina, L.
1384. Croton cumingii, Muell. Arg.
1385. Ardisia subcuneata, Miq.
1386. Premna sp.
1387. Eupatorium resolutum, Vid. (Solidicoma resoluta, Turcz.)
1388. Eugenia (Syzygium) sp.
1389. Ratonia [illegible]ertiana, Vidal (*) (Eupatorium Lesertiana, Comb.)

(*) Instructivo caso para la árdua cuestión de autoridades. Ba-

1390. Globba sp.
1391. Pouzolzia peritandra, Benn. = 1833
1392. Chloranthus brachystachys, Bl.
1393. Arisaema Cumingii, Schott.
1394. Pavetta parvifolia, sp. nov.
1395. Sorghum fuscum, Miq. (Andropogon pedicellatus, Steud.)
1396. Fimbristylis ferruginea, Vahl.
1397. Eleusodropon villosulus, Nees. = 980.
1398. Andropogon sericeus, R. Br. (A. tenuiculus, Steud.)
1399. Perotis latifolia, Ait. (P. glabrata, Steud.) = 1914.
1400. Andropogon leptanthus, Steud.
1401. Vitis adnata, Wall. = 869, 1494.
1402. Uvaria rufa, Bl. = 1271, 1587, 1607.
1403. { Adhatoda aspera, Nees.
Jasminum sp.
1404. Sumbaia rottleroides, Tail. (Mercadonia manadalojonensis, Mr.) (*)
1405. Tuaiarqua moluccana, Bl.

---

+ Fue a Hofe en Genera plantarum (I. p. 4...) visto en el caso de la especie de las barbadas al que no Pator ia sin publicar el nombre, Hiern en Trok. Fl. Brit. Ind. (I. p. 678) lo publica: he si conservia, fuese refunde Pator ia D. en Eupatoria L., siendo onerosa tan con el art. 48 (tasa el mismo) seriamos Pator ia Lessertiana, Hiern y si en barro Eupator no admite tal nombre, ¿Es esto sostenible?

(*) Visto en Trok. Fl. Brit. Ind. Eupatoriaceae indeterminatae en Mus. Paris con el título de la especie de Baillon (Zollinger n. 3341) pero no hallé la planta de Cumings.

1406. Xanthium pedunculare, Kar. = 1437.
1407. Sida cordifolia, L.
1408. Carex Cumingii, Boott.
1409. Indigofera galegoides, DC.
1410. Aglaia hexandra, Turcz. = 1583.
1411. Pycnarrhena Cumingiana, C.B.Cl. (Hartiglisea cauliflora, Turz.)
1412. Dioscorea Cumingiana, sp. nov. = 854.
1413. Fimbristylis nutans, Vahl.
1414. Panicum semiaratum, R.Br. (Brachiaria semiarata, Mez. = 1563.
1415. Xanthonia luzonensis, Stend.
1416. Eragrostis Brownei, Nees.
1417. Cyperus leucocephalus, Retz. (C. sororiatus, Boeckl.)
1418. Lipocarpha argentea, R.Br.
1419. Polygala sp.
1420. Derris scandens, Benth.
1421. Croton Vereauxii, Muell. Arg. = 736.
1422. Panicum colonum, L. = 570.
1423. Clerodendron sp.
1424. Polyalthia sp.
1425. Callicarpa angusta, Schauer.
1426. Saurauja sp.
1427. Pittosporum brachysepalum, Turcz. = 1018.
1428. Diplospora sp.
1429. (*) Embelia philippinensis, C.B.Cl. = 1001.

---

(*) En algunas colecciones mezclado con Maccinium paucido de V. cerum, Forst.

1430. Ichnocarpus ovatifolius, R. Br. = 1547, 1572, 1770, 1809 (tipo), 1861.
1431. Hylophora brevipes, F. Vill. (Amblyoglossum brevipes, Turcz.)
1432. Tectona philippinensis, B. & H. f.
1433. Berrya Ammonilla, Roxb.
1434. Grewia sp.
1435. Ophiorrhiza, sp. = 577.
1436. Vitis sp.
1437. Canthium pedunculare, Bar. = 1406.
1438. Zizyphus exserta, Bl.
1439. Terminalia parviflora, Presl.
1440. Cissampelos Pareira, L. - 671, 1612.
1441. Maoutia platystigma, Wedd.
1442. { Samadera indica, Gaertn.
{ Curanga amara, Juss. = 579, 1444 β.
1443. Conyza viscidula, Wall.
1444. { Heterostemma cuspidatum, Done. = 1449.
{ Curanga amara, Juss. = 579, 1442 β.
1445. Memecylon edule, Roxb. (M. lucidum, Presl.)
1446. Antidesma Bunius, L. = 474, 1203.
1447. Allophylus cobbe, Bl. var. Blancoi, F. Vill. - 1021, 1270.
1448. Allaeanthus luzonicus, F. Vill. = 1199.
1449. Heterostemma cuspidatum, Done. = 1444 β.
1450. Cassia occidentalis, L. = 666.
1451. Premna sp.
1452. Lelwenia Bauerriana, Endl. (Melothria mucronata, Cogn.)

1452. Wrightia Candollei, sp. nov. (W. pubescens ?; in D.C.) (*)
1453. Desmodium Cumingianum, Benth.
1454. Freycinetia luzonensis, Presl.
1455. Ratonia sp.
1456. Rubus fraxinifolius, Poir.
1457. Cyrtandra Lobbi, Clarke.
1458. Gnaphalium luteo-album, L. = 1023.
1459. Callicarpa sp.
1460. Limnophila gratissima, Bl. (L. punctata, Bl.) 1083, 1216.
1461. Triumfetta rhomboidea, Jacq. = 651.
1462. Symplocos sp.
1463. Erysiteronia leptostachys, Endl.
1464. Connarus polyanthus, Planch.
1465. Plagium sp. = 1726.
1466. Ardisia philippinensis, A. DC.
1467. Euphorbiacea indeterminata.
1468. Dioscorea sp.
1469. Uncaria sp. (aff. U. canescens, Roxb.) = 1503.
1470. Dicoptylla verticillata, Benth.
1471. Melastomodium diaricatum, Bl. Meisn.
1472. Leitzea Perrottetii, F. Vill. (Tetranthera Perrottetii, Bl.) var. Cumingii, Meisn.
1473. Maesa membranacea, A. DC.

---

(*) Distinta de la especie de Australia y Timor con la cual Candolle (Prodr. VIII p. 407) con razón la identifica; los caracteres diferenciales que el mismo apunta las separan bien.

1475. Clerodendron sp.
1476. Rhopaloblaste sp.
1477. Alphonsea sp.
1478. Calamus sp.
1479. Cinnocina luzonica, A. Vill. (Chionanthus luzonica, Bl.) 1531, 1545.
1480. Hoya Cumingiana, Dene.
1481. Myristica bracteata, A. DC.
1482. Strychnos multiflora, Benth. = 641, 695, 1059.
1483. Canthium didymum, Roxb.
1484. Ehretia philippinensis, A. L. C. = 471.
1485. Dichroa febrifuga Lour. = 1904.
1486. Litsea luzonica, F. Vill. (Tetranthera luzonica, Bl.) = 1585.
1487. Medinilla bracteata, Bl.
1488. Spathiphyllum commutatum, Schott.
1489. Lepisanthes Cumingiana, A. Juss.
1490. Parsonsia " A. DC.
1491. Euonymus timorensis, Zipp. = 1552.
1492. Pouzolzia arachnoidea, Wedd.
1493. Vitex trifolia, L.
1494. Vitis adnata, Wall. = 869, 1401.
1495. Artabotrys hamata, Bl. = 1099, 1818.
1496. Diospyros pellucida, Hiern.
1497. Salacia sp. = 1606 p.
1498. Eugenia (Syzygium) sp.
1499. Acacia Litsia, Willd. var. caesia, W+A. (Mimosa caesia, L.)

1500. [illegible] sp. (Archidendron Bl.)
1501. Eunasia amara, Blanco = 501, 1312.
1502. Allophyllus Cobbe, Bl. = 826, 1569.
1503. Uncaria sp. (aff. U. canescens, Korth.) = 1470.
1504. " florida, sp. nov. = 862, 895.
1505. Eugenia (Jambosa) sp.
1506. Fagraea morindaefolia, Bl. = 940, 1814.
1507. Columbia subaequalis, Planch. (*) = 1534.
1508. Scirpus barbatus, Rottb.
1509. Garcinia sp.
1510. Scolopia crenata, Clos. (Phoberos crenatus, Kurz.) 1177, 1277.
1511. Antidesma leptocladum, Tul. var. nitida, Muell. Arg.
1512. Eunasia amara, Blanco = 501, 1301.
1513. Antidesma leptocladum, Tul. = 1820.
1514. Randia sp. (aff. R. Cumingiana, Vid. = 1366.)
1515. Grewia multiflora, Juss. = 461, 701.
1516. Terminalia polyantha, Presl.
1517. Stereospermum pinnatum, F. Vill. (Millingtonia pinnata, Blanco)
1518. Bauhinia Blancoi, Bak. (Phanera Blancoi, Benth.)
1519. Peltophorum ferrugineum, Benth.
1520. Gomphia angustifolia, Vahl.
1521. Urophyllum sp.
1522. Nauclea Cumingiana, sp. nov. = 833.
1523. Stephegyne diversifolia, Hook. f.

(*) Nadie que se haya publicado este nombre de Planch. no solo he visto [illegible]

1524. Pterospermum diversifolium Bl. = 967, 1052.
1525. Heritiera littoralis, Ait.
1526. Psychotria sp.
1527. Canthium Villarii, sp. nov. = 886.
1528. Andrachne australis, Fluel. Arg., var angustifolia, Mull. Arg.
1529 Solanum ferox, L. = 690.
1530. Aerua lanata, Juss.
1531. Linociera luzonica, F. Vill. (Chionanthus luzonica, Bl.) = 1479, 1545.
1532. Iodes ovalis, Bl.
1533. Stephania hernandifolia, Walp. = 1160.
1534. Columbia subaequalis, Planch. = 1507.
1535. Mussaenda macrophylla, Wall. ? = 1877.
1536. Seccamone attenuata, Dene.
1537. Helicia philippinensis, Meissn.
1538. Andropogon aureo-fulvus, Stend.
1539. Celtis philippinensis, Blanco
1540. Evolvulus alsinoides, L.
1541. Clerodendron macrostegium, Schauer.
1542. Dalbergia monosperma, Walz.
1543. [illegible] acuminata, Mull. Arg.
1544. Hippocratea indica, Willd.
1545. Linociera luzonica, F. Vill. (Chionanthus luzonica, Bl.) = 1479, 1531.
1546. Mallotus philippinensis, Mull. Arg. = 512, 1318.
1547. Chinoca lus ovatifolius, L. = 1430, 1572, 1770, 1809 (tit.), 1861.
1548. Melodorum latifolium, Dun.

1549. Gnetum latifolium, Bl.
1550. Sarcocephalus cordatus, Miq. = 1245.
1551. Loiailletia sp.
1552. Euonymus timorensis, Zipp. = 1491.
1553. Panax Cumingiana, Rolfe (Paratropia Cumingiana, Presl.)
1554. Canthium arboreum, Vid. (Ronabea arborea, Blanco)
1555. Hippocratea obtusifolia, Jack.
1556. Centratherum sp.
1557. Polyalthia sp.
1558. Xylopia monocephala, L. var. timorensis, Benth. (Timido- rensis, Blend.)
1559. Toxocarpus gracilis, Dene.
1560. Cyrtandra Schizochiloide, Jo. Dlb. (Cyrtandra Schizochiloides, Miq.)
1561. Boehmeria heterophylla, Wedd.
1562. Streptocaulon Baumii, Dene. = 697, 817, 847, 1865.
1563. Albizzia procera, Benth.
1564. Sesamum indicum, L. = 637.
1565. Jasminum sp.
1566. Ixora Cumingiana, sp. nov. = 895, 1233.
1567. Limania albida R. Br. (Schamissoa albida, Miq. non Mart.)
1568. Ardisia Boisserii A. Dlb.
1569. Allophylus cobbe, Bl. = 826 1502.
1570. Myristica inersa, Bl.
1571. Toxocarpus glaucus, Dene.
1572. Linocarpus ovatifolius, A. Dlb. = 1430, 1547, [illegible] 1861.
1573. Clerodendron sp.

1574. Melodinus philippinensis, A.DC.
1575. Gymnostoria " , Vid. Rutterlickia? philippinensis, Planch.) (*)
1576. Sophora tomentosa, L. = 1911.
1577. Hernandia peltata, Meissn. = 1041.
1578. Gouania microcarpa, DC. = 828, 973, 1623.
1579. Gardenia sp.
1580. Buchanania florida, Schauer var. arborescens, Engl.
1581. Harpullia Blancoi, F. Vill. = 1267.
1582. (**) Myristica quatteriaefolia, A. DC.
1583. Aglaia Herandra, Turcz. = 1410.
1584. Cybianthus philippinensis, Hook. f. (Badula cybianthoidea, A.DC.)
1585. Vitex luzonica, F. Vill. (Petamethera luzonica, Bl.) = 1486.
1586. Drosera enterocarpoidea, sp. nov.
1587. Nephelium Longana, Camb. = 1131.
1588. Mitrephora sp.
1589. Uvaria pulla Bl. = 1291, 1402, 1807.
1590. Polyalthia sp.
1591. Phyllanthus diversifolius, Muell Arg. = 1194.
1592. Serianthes grandiflora, Benth.
1593. Albizzia retusa, Benth. = 1223.
1594. Kokoona asiatica Brogn. = 743, 1838.
1595. Salacia sp.

(*) Solo he visto este nombre manuscrito en herb.
(**) 1582 y 1583 están confundidos en muchas séries segun se ve en la lista de recepcion de Kew; C.DC., Turcz. y C.C., los ponen como los decimos

1596. Cordia subcordata, Lam.
1597. Mimusops Elengi, L.
1598. Atalantia nitida, Elr. (Sclerostylis nitida, Turcz.) = 971.
1599. Sarcolaena crenata, Baz. (Rhabdodon crenatus, H. & A.) = 1177, 1510.
1600. Boca pinnipetensis blanco.
1601. Myrsine capitellata, Wall. = 868.
1602. Solanum verbascifolium, L. = 630.
1603. Pittosporum = lobatum, Benth. = 1135, 1134.
1604. Crotalaria chinensis, L.
1605. Zingiber Cassumunar, Roxb.
1606. Guisgualis indica, L. = 1197.
(Salacia sp. = 1497.
1607. Uvaria ovalifolia, Bl. = 1201 1901.
1608. Andrachne australis, Muell. Arg. var. genuina, Muell. Arg.
1609. Anthistiria gigantea, Lar. = 1272.
1610. Phyllanthus trichogynus, Muell. Arg.
1611. Garcinia sp.
1612. Cordia Leschenaultii, DC.
1613. Cissampelos Pareira, L. = 691, 1440.
1614. Trema aspera, Bl. var. viridis, Benth. (Sponia virgata, Planch. v. major, Planch.)
1615. Heteropogon contortus, Roemer Sch. = 1002 b.
1616. Lepicarpus subsericeus, Tul.
1617. Spinopsis Cumingiana, Tiem.
1618. Ipomaea obscura, Choisy. = 618.

1619. Desmodium gyrans, Dlb. = 1338.
1620. Litsea fulva, F. Vill. (Tetra theraefulva, Bl.)
1621. Tephrosia vestita, Vog.
1622. Xanthoxylum Avicennae, Dc. (Fagara Avicennae, Lour.)?
1623. Govania microcarpa, Dlb. = 828, 993, 1578.
1624. Piper kumingianum, Miq. = 1190.
1625. Vernonia cinerea, Less. - 1361.
Blumea sp.
1626. Pipturus asper, Wedd. = 724.
1627. Leptaspis kumingii, Steud.
1628. Crotalaria ferruginea, Grah.
1629. Vernonia arborea, Ham. = 786, 790, 791, 887.
1630. Artabotrys suaveolens, Bl.
1631. Nouaphila stricta, Nees (*).
1632. Bryonopsis laciniosa, Naud.

---

(*) Nees ab Esenbeck en DC. Prodr., vol. XI. f. p. 84 y 96, dice que 1631 en herb. Bentham es esta especie y en herb. Hooker su Cristotis agrimonioides ó sea Gymnostachyum sanguinolentum; videns. ¡Si a pesar de esto la primera sino todos los ejemplares de la última oriundos de Cebú, fuera de esa isla no sé que se haya hallado. El mismo autor en l. c. p. 422 refiere su Nouaphila stricta á N. corymbosa, Bl.; Miquel (Fl. Ind. Batav. II. p. 776-777, le sigue, aunque sin razon relegando á la sinonimia el nombre de Blume más antiguo (año 1826) que el de Nees (año 1847); Clarke (Hook. Fl. Brit. Ind. IV p. 409) señala bien los caracteres diferenciales entre ambas especies y rectifica toda la errónea sinonimia de Nees.

1633. Harrisonia Bennettii, A.W. Benn. var. multijuga, Benn.
(Lansiolepis multijuga, Benn.)
1634. Ardisia serrata, A.DC. var. microbotrys, A. DC.
1635. Aerua velutina, Moq.
1636. Cyperus permatus, Lam. (C. canescens, Vahl.)
1637. Naravelia laurifolia, Wall. = 950.
1638. Gynura sarmentosa, Dc. 726.
1639. Vernonia sp.
1640. Justicia Gendarussa, L. = 905 p., 1043.
1641. Polygonum chinense, L. var. ovalifolia, Meisn.
1642. Lactuca sp.
1643. Litsea Perrottetii, F. Vill. (Actinodaphne Perrottetii, Bl.), var. subcordata, Meisn. = 1473.
1644. Clerodendron sp.
1645. Wendlandia luzoniensis, Dc. = 1102, 1869 p.
1646 Senecio sp.
1647. Gossypium herbaceum, L.
1648. Eugenia Jambosa, L.
1649. Boraëa Vadocana, Blanco = 1149.
1650. Antidesma Ghaesembilla, Gaertn. = 986.
1651. Utricularia rosulata, Benj.
1652. Ixonanthes sp.
1653. Dysoxylum quadrifolia, Benth.
1654. Dipterium funiculum, Ham.
1655. Ammania peploides, Sprng.

1656. Cyperus dilutus, Valil. = 538.
1657. Phaseolus Munjo, L. var. radiata, Bak.
1658. Eranthemum malabaricum, Clarke. (*)
1659. Garcinia (Xanthochymus) sp.
1660. Columbia serratifolia, T. b. (C. inaequilatera, Tuss.) = 5[illegible]. 1753.
1661. Hygrophila salicifolia, Nees.
1662. Desmodium capitatum, DC.
1663. Blumea glomerata, DC. = 1038.
1664. " lacera, DC.
1665. Exacum tetragonum, Roxb.
1666. Vinca rosea, L.
1667. Panicum psilopodium, Trin.
—— angustum, Trin.
1668. Panicum angustissimum, Hochst. ?
1669. Eragrostis tenuissima, Schrad. (Panicum leptanthum, Steud.) = 573.
1670. Hydrolea zeylanica, Vahl.
1671. Crema ambuinensis, Bl. = 1232.
1672. Leucas pubescens, Wight.
1673. Oxanthera indeterminata
1674. Elatostema rigidum, Wedd.
1675. Lagerstroemia sp.
1676. Eugenia sp.
1677. Hibiscus tiliaceus, L.
1678. Dropsylum memecyloides, Vid. (Cymelonema memecyloides, Presl.)

(*) Em alguns herb. mesclados exemplares de 1655.

1677. Uliacrisiana sp.
1678. (*) Emmenia eriosiada, Turcz.
1681. Bonnbretum acuminatum, Roth.
1682. Nepenthes alata, Blanco - 1220, 1357, 1812.
1683. Solenia acuminata, Benth.
1684. Goniothalamus gigantens, H. f. & Th. - 1712, 1746, 1792.
1685. Cornelia philippinensis, Benth. (Stachyanthes philippinus, Turcz.)
1686. Diplotaxis paniculatus, Turcz. - 1726, 1787.
1687. Medinilla sp.
1688. Clerodendron sp.
1689. Braganzia sp.
1690. Saurauja sp.
1691. Adenanthera pavonina, L.
1692. Entada scandens, Benth. = 1260.
1693. Tetrameles Cumingii, F. Vill. (Trigonostemon Cumingii, Muell. Arg.)
1694. Maba buxifolia, Pers.
1695. Cyclostemon Cumingii, Baill.
1696. Begonia quercifolia, Link.
1697. Per. Rhyncolepis (**) C. (Rhyncolepis Cumingiana, Miq.) - 1706.
1698. Vitex sp.
1699. Derris sp.
1700. Dracontomelum Cumingianum, Baill.

(*) Vitaceo nortiniense, sinónimo á de Price, como = 1144, 1302. Sinonimia catalogada bajo Cissus (S. Cumingiana, de Vriese).

(**) Veas de Candolle (Dc. Prodr. XVI 1ª 344) Rhyncolepis hoy errata tipográfica.

1701. Adiantis vestita Kl. Br.
1702. Myristica ardisiaefolia, A. DC.
1703. Buchanania nitida, Engl.
1704 Euphoria stellulata, Rich. (Sapindus stellulatus, Turcz.)
1705. Oropliea sp. = 1714?
1706. Piper Rhyncolepis, C. DC. = 1697.
1707. Gesneria Cumingiana, Rolfe (Calliearpa Cumingiana Schauer)
1708. Piper miniatum, Bl. = 841.
1709. Salacia sp.
1710. Eugenia (Syzygium) sp.
1711. Ardisia angustifolia, A. DC.
1712. Saurauja sp.
1713. Ereemia sp.
1714. Oropliea sp. = 1705?
1715. Polyalthia sp.
1716. Ilangium octopetalum, Blanco (I. Emarchii, Thwait
1717. Lepidagathis laxa, Nees.
1718. Meritha javanica, Bl.
1719. Gymnostachyum affine, Nees.
1720. Alyxia sp.
1721. Claoxylon sp.
1722. Homonoya riparia, Lour.
1723. Astronia Rolfei, sp. nov.
1724. Uperosa microcalyx, Hassk. = 760.
1725. Hiptocrates Cumingii, Laws.

1726. Diplodiscus paniculatus, Turcz. = 1686, 1787.
1727. Cytandrea dubia
1728. Dillenia sp.
1729. Uvaria sp.
1730. Procris grandis, Wedd.
1731. Randia sp.
1732. Premna sp.
1733. Commersonia platyphylla, Andr. = 1005.
1734. Eupania sp.
1735. Entada Gruneri, L.
1736. Grewia sp.
1737. Ixora sp.
1738. Unonia virgata, Bl. (Uvaria virgata, Bl.)
1739. Lepitaspis urceolata, R. Br. (L. manillensis, Steud.)
1740. ?
1741. { Osmelia conferta, Benth. = 1742 p.
Blaeopsylon sp. = 515.
1742. { Osmelia conferta, Benth. = 1741 p.
Erycibe sp. = 1743.
1743. (*) Erycibe sp. = 1742 p.
1744. Bauhinia bidentata, Jack.
1745. Evodia Roxburghiana, Benth. = 904.
1746. Xanthophyllum gigantum, H. f. & Th. = 793, 1684, 1947.

(*) Se observa confusion en 1741, 1742 y 1743; no he visto 1740.

1747. Melastoma penicillatum, Naud. (*)
1748. Ilex sp.
1749. Adenostemma viscosum, Forst.
1750. Blumea chinensis, DC.
1751. " laciniata, DC. = 659, 969.
1752. Saurauja sp.
1753. Columbia serratifolia, DC. = 877, 1660.
1754. Cratoxylon formosum, Dyer (Tridesmis formosa, Korth.)
1755. Evodia latifolia, DC. = 1853.
1756. Rhynium sp. = 1466.
1757. Mallotus sp.
1758. Kayea philippinensis, Planch.
1759. Eleaeagnus latifolia, L.
1760. Clerodendron cuningianum, Schauer.
1761. Ratonia Zygolepis, Turcz. (Hydrolis reflexa, Turcz.)
1762. Connarus neurocalyx, Planch.
1763. Rhynchospora aurea, Vahl.
1764. Carex fibrata, Boott.
1765. Litsea chinensis, Lam.
1766. Leucosyke capitellata, Wedd. = 1350, 1842.
1767. Fuirena sp. (aff. F. angustifolia, L.)
1768 Callophyllum inophyllum, L.
1769. Eurycles amboinensis, Lour.
1770. Ichnocarpus ovatifolius, R. DC. = 1430, 1547, etc.

(*) Segun Triana, "Melastomaceae" p. 60, n. 17

1771. Clematis smilacifolia, Wall.
1772. Malaisia tortuosa, Blanco = 1314.
1773. Geunsia farinosa, Bl.
1774. Grewia umbellata, Roxb.
1775. Ryssopterys dealbata, A. Juss.
1776. Semecarpus albescens, Thwaites.
1777. Ixatoxylon Blancoi, Bl. - 705, 1822.
1778. Ballicarpa sp.
1779. Geunsia sanctuensis, L.
1780. { Momordica ovata, Loqu.
Harrisonia Brownii, Juss. = 1828.
1781. Alchornea javensis, Muell. - 786, 920, 1204.
1782. Eragrostis megastachya, Link.
1783. Barrutheria pilosa, Pl. Vill. (Koilia? pilosa, DC.)
1785. Bauhinia cumingiana, Benth. (Pauletia cumingiana, Benth.)
1784. Artocarpus " , Trec.
1786. Elaeocarpus bullifolia, Roxb.
1787. Trichodiscus paniculatus, Turcz. - 1686, 1726.
1788 Schefflera timoriensis, DC.?
1789. Momordica cochinchinensis, Spreng.
1790. Jasminum bifarium, Wall. var. glabra, Clarke.
1791. ?
1792. Goniothalamus giganteus, Hook. f. & Th. = 793, 1684, 1716.
1793. Grewia sp.
1794. Alpinia malaccensis, Rosc.

1795. Carex cumingiana, Steud.
1796. Pycnospora hedyzaroides, R. Br. = 1797.
1797. " " " = 1796.
1798. Helicteres angustifolia, L.
1799. Ophiorrhiza sp.
1800. Alchornea parviflora, Muell. Arg.
1801. Amomum ramosum, Anders.
1802. Wrightia ovata, A. DC. = 1279.
1803. Aganosma alutina, A DC.
1804. Croton Tiglium, L. = 871.
1805. Cassia Fistula, L.
1806. Voacanga cumingiana, Rolfe.
1807. Uvaria rufa, Bl. = 1291, 1402, 1589.
1808. Desmodium pulchellum, Benth. = 605.
1809. Ichnocarpus ovatifolius, A. DC. (Tipo!) (*) 1430, 1572, 1911, 1770, 1861,
1810. Pentapetes phoenicea, L.
1811. Uncaria sclerophylla, Roxb.
1812. Nepenthes alata, Blanco = 1220, 1337, 1682.
1813. Piper corylistachyon, C. DC. var. magnifolia, C. DC.
1814. Syzygium cumini aefolia, Bl. = 1140, 1556.
1815. Pygeum latifolium, Mig.
1816. Memecylon pyrifolium, Presl.
1817. Sclerin lithosperma, Willd. (S. glaucescens, Presl.)
1818. Artirotrys harmata, Bl. = 1079, 1495.
18 . Evodia triphylla, DC. (E. Lamarckiana, Benth.)

(*) Creo, como A. de Candolle (Phytographie p. 51 nota) que en

1820. Antiderma leptocladum, Tul. = 1513.
1821. Phyllanthus sp. (aff. Ph. mollis, Muell. Arg.)
1822. Cratoxylon Blancoi, Bl. = 700, 1777.
1823. Polyalthia sp.
1824. Diospyros paniculatum, Kurz. = 821.
1825. Eugenia (Syzygium) sp. = 861.
1826. Polyalthia sp.
1827. Antirrhoea philippinensis, Rolfe (Guetardella philippinensis, Benth.)
1828. Harrisonia Brownii, Juss. = 1780 p.
1829. Diospyros multiflora, Blanco.
1830. Vitex littoralis, Dene. = 1144, 1365.
1831. Melodinus Cumingii, A. DC.
1832. Rothboellia muricata, Kelz.
1833. Pouzolzia puntandra, Benn. = 1391.
1834. Fucrenia umbellata, Rottb. = 1254.
1835. Dysophylla auriculata, Bl.
1836. Rubiacea indeterminata.
1837. Rubus glomeratus, Bl. = 755, 1158.
1838. Colubrina asiatica, Brogn. = 743, 1594.
1839. Lasiolobus macrocephalus, Wedd. = 768.
1840. Stenostemma Pierrei, Gilg. 787.
1841. Miscanthus luzonensis, Hack. (Saccharum ? vaugrande, Steud.) =
1842. Leucosyke capitellata, Wedd. = 1350, 1761.

---

ez de tipo deberia llamarse ejemplar auténtico pero en aras de la brevedad sigo el uso gener

1843. Piper Rhyncolepis, C. DC. var. brevicuspis, C. DC.
1844. Derris uliginosa, Benth.
1845. Rhynchosia microstemma, A. Juss.
1846. Ophiorrhiza sp.
1847. Tristaxis sp.
1848. Canthium sp.
1849. Ormocarpum senegalense, DC.
1850. Micromelum sp. (aff. M. pubescens, Bl.)
1851. Rubus fragilis, Blanco. = 457.
1852. Securidaca sp.
1853. Evodia latifolia, DC. = 1755.
1854. Pithecolobium Lobatum, Benth. = 475, 1603.
1855. Elaeagnus pierreana, Muell. Arg.
1856. Solenatis Gouriana, Roxb. = 766.
1857. Tristiria triptera, Radl. (Melicocca triptera, DC., Zollingera triptera, Rolfe)
Rhus simarubaefolia, A. Gray, var. laitensis, Engl.
1858. Leea sambucina, Willd. = 606.
1859. Hibiscus (Abelmoschus) sp.
1860. Pterospermum sp.
1861. Schinocarpus, ovatifolius, A. DC. = 1430, 1547, 1770, 1809 (Tiplo)
1862. Faccamontana, Schult.
1863. Psychotria sp.
1864. Lepisteman sp.
1865. Strutocaulon Baumii, Schinz. = 697, 817, 847, 1562.
1866. Vitex Negundo, L.

1867. Ardisia sp.
1868. Crotalaria calycina, Schrank.
1869. Wendlandia luzoniensis, DC. = 1102, 1643.
Plagnium densiflorum, Bl.
1870. Parameria philippinensis, Radlk. = 1126.
Excoecaria agallocha, L.
1871. Croton consanguineus, Muell. Arg.
1872. Blancoa sp.
1873. Uvaria lagoides, DC.
1874. Fatoua pilosa, Gaud.
1875. Blumea sp.
1876. ? (*)
1877. Mussaenda macrophylla, Wall. ? = 1535.
1878. Anisomeles ovata, R. Br. = 643.
1879. Desmodium gangeticum, DC.
1880. Panicum auritum, Presl. = 1274.
1881. Ixora sp.
1882. Crepis japonica, Benth.
1883. Floscopa scandens, Lour.
1884. Achyrospermum philippinense, Benth.
1885. Sarcostemma reticulata, Miq. (Streptadenia reticulata, Miers.)
1886. Crotalaria assamica, Benth.
1887. Cordia speciosa, Smith.

(*) Tal vez aquí corresponda Parameria philippinensis, Radlk. vista en [illegible] con 1870, aunque también Excoecaria Agallocha, L.

1888. Aristolochia Tagala, Cham.
1889. Ficus inca indeterminata
1890. Andropogon brevifolius, Sw.
1891. Henslowia bicolor, Wight.
1892. Teramnus labialis, Spreng.
1893. Sonerila sp.
1894. Amoora brunningiana, C.DC.
1895. Siderophyllon Duclitan, Blanco = 770.
1896. Crypteronia sp.
1897. Begonia philippinensis, A.DC.
1898. Freycinetia sp. (aff. F. insignis, Bl.)
1899. Ixonanthes micracantha, Don.
1900. Clerodendron sp.
1901. Uvaria ovalifolia, Bl. = 751, 1607.
1902. Buddleia asiatica, Lour. = 1034.
1903. Eugenia (Jambosa) sp.
1904. Dichroa febrifuga, Lour. = 1485.
1905. Olea sp.
1906. Myrsine gracilis, Roxb. (Rapanea gracilis, Blanco)
1907. Desmodium canescens, R. Br. (D. floccosa, Schlecht.)
1908. Morea indeterminata ? (*)
1909. Pisonia aculeata, L. = 1018, 1064.
1910. Diplospora sp.?
1911. Sophora tomentosa, L. = 1576

(*) Nombre de la lista de recolección de Merrill, no he hallado la planta en herbario.

1912. Sphaeranthus africanus, L.
1913. Gmelina hystrix, Kurz.
1914. Perotis latifolia, Ait. = 1399.
1915. Dichrocephala latifolia, DC.
Dichrocephala sp.
1916. Gymnopetalum cochinchinense, Kurz.
1917. Melothria leucocarpa, Cogn. var. triloba, Clarke.
1918. Pittocolobium montanum, Benth. var. microphylla, Benth.
1919. Alsinia chinensis, Rosc.
1920. Blumea virens, DC. = 1023.
Pegeroniia reticulata, Miq.
1921. Ficus (Eusyce) sinuosa, Miq. = 1924.
1922. " " rapiformis, Roxb. = 1923.
1923. " " " " 1122.
1924. " " sinuosa, Miq. 1121.
1925. " " Cumingii "
1926. " " rostrata, Lam.
1927. " " disticha, Bl.
1928. " " acuminatissima, Miq.
1929. " (Urostigma) clusioides, Miq.
1930. " " caulobotrya, "
1931. " " indica, L.
1932. " " nuda, Miq.
1933. " (Eusyce) microphoda, "
1934. " " copiosa, Steud.

1935. Ficus (Urostigma) parvifolia, Miq.
1936. " " benjamina, L.
1937 " (Eusyce) philippinensis, Miq.
1938. " (Covellia) cuneata "
1939. " " ribes, Reinw.
1940. " (Urostigma) concinna, Miq.
1941 " (Eusyce) pedunculosa, "
1942. " " radicans, Roxb.
1943. " " sp. (aff. F. philippinensis, Miq.)
1944 " " lanciifolia, Miq.
1945. Loranthus (Heteranthus) sp.
1946. " (Dendrophtoe d.) sp.
1947. (Heteranthus) malifolius, Presl.
1948. Viscum orientale, Willd. = 1950, 1954, 1961.
1949. Loranthus (Pseudovisculium) spicifer, Fr. Vill. (Loranthus spicifer, Presl.)
1950. Viscum orientale, Willd. = 1948, 1954, 1961.
1951 Loranthus (Macrosolen s.) cochinchinensis, Roxb. = 1953.
1952. " (Heteranthus) sp. = 1958.
1953. " (Dendrophtoe, e) sp. (*)
1954. Viscum orientale, Willd. = 1948, 1950, 1961.
1955. Loranthus (Dendrophtoe, d, sp.
1956 " (Heteranthus) Haenkeanus, Presl.
1957. " " sp. = 1952.

(*) Engl. Bot. Jahrb. f. Syst. Pflanzengesch., Vol. III (1882) 210, [illegible] including Macrosolen c. racemulosus.

1958. Loranthus (Heteranthus) sp. = 1952.
1959. " (Dendrophitor) sp.
1960. Viscum (Nepiduria) sp.
1961. " orientale, Willd. = 1948, 1950, 1954.
1962. Loranthus (Dendrophitor) sp.
1963. " (Macrosolen) ampullaceus, Roxb. = 1957.
1964. " (Heteranthus) luzoniensis, Presl.
1965. " (Dendrophitor d.) curvatus, Bl.
1966. " (Heteranthus) sp.
1967. " (Dendrophitor) sp.
1968. Ginalloa Cumingiana, F. Vill. (Viscum Cumingianum, Presl.)
1969. Loranthus (Macrosolen, L. densiflorae) sp.
1970. " (Lichlanthus) sphenoides, Bl. = 490.
1971 " (Lepiostegeres) sp.
1972. Henslowia sp. ?
1973. Loranthus (Dendrophitor, d.) sp.
1974. " (Lepiostegeres) sp. (aff. 1971)
1975. " (Phaenicanthemum) pentapetalus, Wall.
1976. " (Heteranthus) sp.
1977. " (Lichlanthus) philippinensis, Cham. & Schlecht. = 491.
1978. Ficus (Urostigma) stipulosa, Miq.
1979. ?

1980. } Licopodiáceas y Criptógamas vasculares. (*).
2042. }

2043. Didrobium subsessile, Reichb. f.

(*) Véase Montagne en "London Journal of Botany" Vol. III y IV, y

2044. Trichoglottis rigida, Bl. = 2050

2045. Dendrobium crumenatum, Sw. Hb. Brit. Mus.

2046. Aeginetia indica, Roxb.

2047. Cyrtopodium ensiforme, Vid. (Cyrtopera ensiformis, Lindl.) 2078 p.

2048. Eria ornata, Lindl.

2049. Cymbidium pendulum, Bl. = 2082, 2121.

2050. Trichoglottis rigida, Bl. = 2044.

2051. Phalaenopsis rosea, Lindl.

2052. ?

2053. Cyrtopodium squalidum, Vid. (Eulophia squalida Lindl.; Cyrtopera squalida, Reichb. f.). "marked Singapore in herb." see p. 92.

2054. Bromheadia palustris, Lindl.

2055. Spathoglottis plicata Bl. = 2078 p.

2056. Sarcochilus amplexicaulis, Reichb. f. (Dendrocolla amplexicaulis, Bl.)

2057. Dendrobium metachilinum, Reichb. f.

2058 Arundina speciosa, Bl.

2059. Eulophia graminea, Lindl.

2060. Cypripedium barbatum, Lindl.

2061. Vanda lamellata, Lindl. = 2069.

2062. Thelasis triptera, Reichb. f.

2063. Eria bracteata, Reichb. f.

2064. Saccanthe furcata, Baten.

2065. (Eria retroflexa, Lindl. In Hb. Brit. Mus. = E. ornata Lindl.
Cyrtopodium bursigerum, Lindl. = 2066.

---

Berkeley "Decades of Fungi" en la misma revista.

2066. Dendrobium bursigerum, Lindl. = 2065 p.
2067. Acriopsis sp.
2068. Dendrobium indivisum, Bl.
2069. Vanda lamellata, Lindl. = 2061.
2070. Vanilla sp. calofrogon Rolfe.
2071. Eria vulpina, Reichb. f.
2072. Rhyncostylis retusa, Bl. = 2098 p. 2103, 2105.
2073. Platyclinis uncata, Rolfe, (Dendrochilum uncatum, Reichb. f.) =
2074. ?
2075. Habenaria (Platanthera goodyeroides Lindl.) = 2151.
2076. Bulbophyllum penicillium, Par. & Reichb. f.
2077. " adenopetalum, Lindl.
2078. Spathoglottis plicata, Bl. = 2055
Cyrtopodium ensiforme, Vid. (Cyrtopera ensiformis, Lindl.) = 2047
2079. Eria sp.
2080. Appendicula sp.
2081. Sarcostemma brevistigma Wight & Arn. ?
2082. Cymbidium pendulum, Bl. = 2049, 2121. C. Findlayorianum. Hb. Brit. Mus.
2083. Orchidea indeterminata.
2084. Pholidota imbricata, Lindl. (*)
2085. Grammatophyllum multiflorum, Lindl.
2086. Habenaria muricata, Vid. (Dissorhynchium muricatum, Schauer) = 2133, 2142.
2087. Plocoglottis sp.

(*) Enduplicado recibido del Museo Británico es Eria ornata, Lindl. = 2048.

2088. Sciaphila maculata, Miers.
2089. Orchidea indeterminata.
2090. " "
2091. Habenaria aristulifera, Reichb. f.
2092. Phalaenopsis amabilis, Bl.
2093. Orchidea indeterminata
2094. Zeuxine sp. striatermatica Kew.
2095. Habenaria stipulifera Par. + Reichb. f.
2096. Orchidea indeterminata.
2097. Cala the conspicua, Lindl.
2098. { Rhynchostylis retusa, Bl. = 2072.
{ Uerides quinquevulnerum, Lindl. = 2143.
2099. Lisparis gregaria, Lindl. = 2141.
2100. Saccolabium compressum, Lindl.
2101. ?
2102. Dendrochilum pumilum, Reichb. f.
2103. Platyclinis uncata, Rolfe (Dendrochilum uncatum, Reichb. f.) 2073. 2105.
2104. " glumacea, Hemsl. (Dendrochilum glumaceum, Lindl.)
2105. " uncata, Rolfe. ( " uncatum, Reichb. f.) 2073, 2103.
2106. Cleisostoma sp.
2107. Geodorum semicristatum, Lindl.
2108. Anathoglottis torrentosa, Lindl.
2109. Hetaeria tenuis Vid. (Rhynchidia tenuis, Lindl.)
Hb. Lindl. = Goodyera rubicunda
Brit. Mus. = Hetaeria oblongifolia.
2110. Corymbis veratrifolia, Reichb. f.

2111. Tropidia sp.
2112. Dendrobium aciculare, Lindl.
2113. Oberonia imbricata, Lindl.
2114. Sarcochilus philippinensis Vid. (Camarotis philippinensis, Lindl.)
2115. Oberonia ancipita, Lindl. ?
2116. Appendicula micrantha, Lindl. = 2129.
2117. ? Oberonia anceps ?
2118. Eria fusca, Bl.
2119. Sarcochilus sp.
2120. Oberonia sp.
2121. Cymbidium pendulum, Bl. = 2049, 2082.
2122. Eria sp. stellata
2123. Podochilus sp.
2124. ?
2125. ?
2126. Dendrobium luzonense, Lindl.
2127. ?
2128. Eria polyura, Lindl.
2129. Appendicula micrantha, Lindl. (*) = 2116
2130. Cirrhopetalum sp.
Eria ovata, Lindl. = 2139.
2131. Eria sp.
2132. Vanilla sp.
2133. Habenaria muricata, Vid. (Dissolunchium muricatum, Schauer) 2086, 2142.

(*) Sequin Reichenbach (Walk. Linn. VI. p. 275) Eria rivens Reichb. f.

2134. ~~Habenaria~~ Geronia Thisbe, Reichb. f. ?
2135. Dendrochilum hymenanthum, Reichb. f.
2136. Dendrobium lunatum, Lindl.
2137. ?
2138. Ophiopogon sp.
2139. Eria ovata, Lindl. = 2130 p.
2140. Trichoglottis philippinensis, Lindl.
2141. Liparis gregaria, Lindl. = 2099.
2142. Habenaria muricata, Vid. (Dissolynchium muricatum, Schauer) 2086, 2133.
2143. Uperides spinosa rubrorum, Lindl. = 2098.
2144. Microstylis carinata, Reichb. f.
2145. Sarcochilus calceolus, Lindl.
2146. Orchideæ indeterminatæ.
2147. Sarcochilus sp. = 2149 p.
2148. Cirrhopetalum sp.
2149. { Sarcochilus sp. = 2147
{ Aspendicula xyrtiophora, Reichb. f.
2150. " sp.
2151. Habenaria (Platanthera goodyeroides, Lindl.)
2152. Ceratostylis retisquama, Reichb. f.
2153. Tropidia sp.
2154. } Criptogamas celulares. (*)
2242. }

(*) Véase nota p. 83.

# Lista de Localidades.

1–138. (*) Calauan, Prov. Laguna, Isla de Luzon.
139–174. Prov. Albay. " " "
175 192. Prov. Camarines Sur. " "
193–228. Prov. Albay. " "
229–232. Monte Mahaikay, Prov. Laguna y Tayabas, Isla de Luzon.
233–248. Prov. Batangas " "
249–250. Prov. Nueva Ecija " "
251–254. Prov. Ilocos Sur " "
255–261. " " Norte. " "
262–276. Prov. Cagayan. " "
277–279. Isla de Guimarás (**).
280–286. Isla del Corregidor (***).
287–293. Distrito de Misamis, Isla de Mindanao.
294–318. Isla de Leyte.
319–336. Isla de Samar.
337–347. Isla de Cebú.
348–354. Isla de Bohol.
355–356. Prov. Ilo-ilo, Isla de Panay.

---

(*) Insertamos las localidades de los Helechos porque, hallándose anotadas con más precision que las de las Fanerogamas en general, pueden servir de indicios para los itinerarios de Cuming.
(**) Inmediata á Ilo-ilo, Isla Panay.
(***) En la entrada de la bahia de Manila.

357-361. Isla de Mindoro.
362-368. Singapore.
369-407. Malaca (374 Mindoro segun J. Smith).
408-430. Prov. Zambales, Isla de Luzon.
430-470. Filipinas. Hallados con localidad màs concreta solo los siguientes:
453. Prov. Laguna.
483. Calauan, Prov. Laguna.
507. Prov. Laguna.
541. " "
683. " Tayabas.
691. Calauan, Prov. Laguna.
693. Isla del Corregidor.
696. " " "
741-749. Prov. Pampanga, Isla de Luzon.
750-833. Prov. Tayabas.
834-1129. Prov. Albay. Hallados con etigueta de localidad distinta los siguientes:
955. Prov. Pangasinan, Isla de Luzon.
1008. " " " " "
1010. " " " " "
1011. " " " " "
1122. " Zambales.
1131. " Pangasinan.
1149. " Ilocos Sur.
1152. " " "

1173. Prov. Cagayan.
1201. " Ilocos Norte.
1324. " Cagayan.
1381. " Nueva Ecija.
1430-1603. Prov. Batangas. Con etiqueta distinta los siguientes:
1455. Prov. Camarines Sur.
1479. Isla de Mindoro.
1570. " " "
1560. " " "
1604-1634. Distrito de Misamis, Isla de Mindanao.
1635-1673. Isla de Panay.
1674-1732. Isla de Samar. Con etiqueta distinta:
1688. Isla de Panay.
1689. " " "
1724. " " Leyte.
1733-1757. " " "
1758-1789. " " Cebú.
1790-1810. " " Negros.
1811-1857. " " Bohol.
1858-2042. Filipinas. Hallados con localidad especificada:
1881. Isla de Bohol.
1900. " " "
1903. " " Samar.
Orquideas (excl. 2046 y 2081.):

2043 - 2153. Filipinas. (*).
Criptogamas celulares.
2154 - 2242. Filipinas. (**).

(*) Como de esta procedencia se hallan en lista de recepcion de Kew y en las etiquetas vistas; pero en la lista de Criptogamas celulares Cuningianas del mismo establecimiento hay una nota que dice "2043-2153 Orchids, but 2053 - 2058 marked Singapore in herb."

(**) Su enumeracion en l. c.

Nos. 2252 - 2399 Malacca 2043

2428 - 2443 Sumatra *

Vase-brush. 363 - 368 Singapore.
369 - 407. Malacca
420 - 429 St. Helena
"no enumeration of Sumatran [illegible] found" Rolfe.

* The numbers from Sumatra and St. Helena are not exactly indicated in Vidal. [illegible] Rolfe [illegible]

169.

# Características
# ó
# Descripciones Abreviadas
# de
# Algunas Especies Nuevas.

Artabotrys Cumingianus. (Anonaceae.)

Frutex scandens. Ramuli nigricantes, rimosi, sparsim lenticellati, glabri vel extremitates, cum gemmis et partibus novellis, ferrugineo villosae. Petioli brevissimi, 2-3 mm., vel subnulli, incrassati, rugosi. Folia basi acuta, elliptico-lanceolata, obtuse acuminata, longa 10-18 cm. lata 4-5, glabra vel in nervio medio sparsim setosa; nervi primarii laterales utringue 12, arcuati cum reticulatione prominentes. Flores subsolitari in pedunculis lignosis uncinato-retrofactis setosis vel glabriusculis, pedicellis validis, ferrugineo-pilosis. Petala sub-aequalia, 3 cm. longa, ovata, crassa, velutino-villosa, subcarinata.

Cum. 970, Prov. Albay.

Esta especie es del grupo de A. odoratissimus, R. Br. y parece afine á A. crassifolius Hook. f. & Th., de Malacca; pero la forma de las hojas, los pedicelos mas largos y las flores menores la separan de ellas. 169.

170

Polyalthia lanceolata. (Anonaceae.)

Frutex vel arbuscula. Ramii fusco-cinerei, glabri, rugoso-striati. Petioli brevissimi, 1-2 mm., incrassati, rugosi, puberulo-setosi. Folia basi rotundata vel leviter peltata, lanceolata, acuminata, longa 5-15 cm. lata 15-30 mm., glabra nisi secus nervium medium; nervi primarii laterales tenues, reticulati, ad tertium limbi in nervio extramarginale coaliti. Pedunculi extra-axillares vel oppositifoli in ramulis tenuissimis defoliatis, 1-2 cm., cum floribus rugoso-pilosi, bracteolae lineares, subulatae, pilosae. Petala crassa, fusca, subaequalia, 1 cm. x 3-5 mm., interiora angustiora, apice incurvo lanato, extus pubescentia praesertim ad marginem.

Cumm. 450. – Herb. prop. 954 S. Mateo, Prov. Manilla.

Oropheа buniingiana. (Anonaceae.)

Ramuli, gemmae et partes novellae ferrugineo-tomentosi. Petioli breves, 3-5 mm., rugoso-pubescentes. Folia oblonga apice obtusa basi acuta, longa 5-10 cm. lata 2-3 cm., subtus in nervis, praesertim in nervio medio, pilosa. Pedunculi communes axillares vel supra-axillares, breves, circa 3 mm., 3-4 flori, bracteati. Flores parvi, 1 cm., breviter pedunculati, 5 mm. Sepala

ovata, pilosa. Petala rugoso-velutina. Ovaria dense rufo-pilosa.

Cum. 854; 1412 Prov. Albay. – Herb. prof. 9444 Calauan, Prov. Laguna, Luzon.

Ufine á O. erythrocarpa Bedd (In Trans. Linn. Soc. XX. 5; Ic. Pl. Ind. Or. t. 68) con la cual dudosamente la identifiqué en Atlas Sinopsis, pág. XII (err. O. erythrocalyx); puede distinguirse de ella por las hojas de ápice mas obtuso, menor pubescencia, flores algo mayores, pedunculos mucho mas cortos etc.

170.

171.

Cryptea enterocarpoidea. (Anonaceae.)

Arbor. Ramorum cortex nigricans, rimosus. Ramuli et innovationes dense ferrugineo tomentosi. Petioli breves, 3-5 mm., incrassati, tomentosi. Folia elliptico-oblonga, acuminata, longa 6-20 cm. lata 3-8 cm., nervis obliquo-parallelis, supra glabra vel sparsim pilosa, subtus glabriuscula vel, praesertim in nervis, tomentosa. Flores in fasciculis cymosis extra-axillaribus, 6-10, parvi, 1 cm. Sepala cum pedunculis, bracteis et petalis extus dense ferrugineo-tomentosa. Carpella 6, longa, 6-12 cm. X 5 mm. diametro, torulosa, rugoso-tomentosa, nigricantia, C. enterocarpae, Maing. ex descriptione cl. Hookeri (Fl. Brit. Ind. I. p. 92) similia.

Tayabas, Luzon.

Cum. 1586 Prov. Batangas. – Herb. prof. 1107 La Limanoc, Prov.

Rubus Rolfei. (Rosaceae.)

Frutex ramis decumbentibus ramulis floriferis saepius inermibus, teretibus, cum petiolis et reverso foliarum ochraceo villosis. Petioli validi, 2-4 cm. Folia simplicia, e basi cordata, 3-5 lobata, acute inaequaliter serrata, ampla, longa 5-10 lata, cm. 5-12 cm. supra glabra bullata, infra pulchre lacunoso-reticulata, quinque-nervia nervis prominentibus. Flores in paniculis racemosis vel racemis axillaribus vel terminalibus, 3-4 cm.; bracteae conspicuae, pinnatisectae, albicans-villosae; pedunculi breves, dense fulvo villosi. Calyx profunde fissus, segmentis, 2 cm., ovato-lanceolatis longe acuminatis, dense fulvo pilosis. Petala albo, caducissima. Fructus conico-globosus, rubrus. 171.

172 Bum. 808 Prov. Tayabas. — Herb. prof. 294 en la cumbre del monte Banahao de Lucban, Prov. Tayabas, 1800 m. altitud.

Por el tamaño de las flores y aspecto de las hojas es sin duda el mas hermoso de los Rubus filipinos, solo lo he visto en la localidad mencionada, así como la Cumingia macrophylla, Bl., faltando ambos al parecer en la vecina cumbre del Banahao de Mahaylay (2200 m.), por lo ménos en la parte Sur. Temeroso de separar especies en género tan comprometido lo identifiqué con R. laciniaefolius, Poir. (Vease Atlas Sinopsis pág XXV. y lam.

XLVI. b.) del cual, así como de su afine R. chrysophyllus, Reinw., ha resultado distinto en la revisión hecha en el Museo de Kew; así de justicia y con placer lo dedico al botánico Mr. R. A. Rolfe que en aquella tarea me guió.

Decaspermum Blancoi. (Myrtaceae.)

Frutex vel arbuscula ramis teretibus, rugoso-striatis, puberulis, fusco-rufescentibus, partibus novellis pubescentibus. Petioli brevissimi vel subnulli. Folia oblongo-lanceolata vel lanceolata utrinque acuminata, longa 3-4 cm. lata 10-15 mm., glabra vel subtus praesertim ad nervationem adspurse pilosa, nitida, lacte viridia, in siccis supra nigricantia subtus brunneo-rufescentia. Flores in cymis terminalibus vel axillaribus paniculam foliosam simulantibus, bracteatis, bracteolis sub pedicellorum apice, pedicellus 10-15 mm., flos expansus 2 cm. Calycis tubus globosus cano-pubescens, segmentis 5, ovatis obtusis, glabratis. Petala 5, albo-purpurea. Bacca globosa, calycis segmentis coronata, pisi magnitudine.

Synon. — Myrtus communis, Blanco non L. (Fl. Filip. 1.ª ed. p. 422); Melitris rubra, F. Vill. non Bl. (Fl. Filip. Append. IV. 173. Flores. App. p. 84; S. Vidal Sinops. Fam. Gen. Atlas (Lám. 20. f. b.)

——————→ 172.

Cum. 801 Prov. Tayabas. — Herb. prop. 322 Umat, Prov. Bulacan.

Eugenia (Jambosa) cinnamomea. (Mirtaceae)

Arbor. Ramuli teretes, cinnamomea. Folia oblongo-lanceolata, obtuse acuminata, e basi cuneata, breviter petiolata, longa 5-12 cm. lata 20-50 mm., petioli 1 cm., nitida, subtus minute et crasse nigro-punctata, in siccis colorata, coriacea; nervi laterales primarii utringue 6-8, conspicui, ante marginem coaliti. Paniculae trichotomae, cymosae, terminales vel axillares, multiflorae, pedunculis tetragono-complanatis nigricantibus, floribus mediocribus, 15 mm., breviter pedicellatis, pedicellis articulatis. Calyx turbinatus segmentis orbicularibus coriaceis margine scariosa. Petala alba.

Cum. 846 Prov. Albay. – Herb. prop. 329, San Mateo, Prov. Manila.

Eugenia (Syzygium) cumingiana. (Myrtaceae.)

Arbor. Ramuli cinerei, teretes ad apicem leviter compressi. Folia elliptico-ovata, e basi cuneata, apice caudato obtuse acuminata, 4-6 cm. × 20-25 mm., modice petiolata, circa 6 mm., coriacea laete viridia, in siccis concolora vel subtus fulvo-nigrescens-maculata, inpellucida; nervi laterales tenues, creberrimi, reticulati, prope marginem coaliti. Paniculae cymosae trichotomae, terminales vel axilares, pedunculis tetragonis, floribus

ramis, in alabastro 1 mm. expansis 3 mm., sessilibus. Calyx hemisphaerico-turbinatus, ad basin in pseudo-pedicello angustatus. Petala coalita (?), alba. Bacca globosa vel ad orem contracta, calycis margine incrassata coronata, fusi minor, circa 4 mm.

Bum. 925 Prov. Albay. — Herb. prop. 325 Biosoboso, Distrito Morong; 1410 Infanta, Prov. Zambales, Luzon, (N. v. Malapaitan).

Astronia Cumingiana. (Melastomaceae.)

Arbor ramis rugoso-tuberculis cum partibus novellis rufescens-ochraceo leprosis. Petioli 3-4 cm. rugosi, canaliculati. Folia basi cuneata, oblongo-lanceolata, acuminata, longa 10-15 cm. lata 30-35 mm., discolora, subtus pallido-ochracea minute lepidota, praeter nervium tenuem utringue submarginalem triplinervia, nervis secundaris patulis distantibus. Paniculae corymbosae, ochraceo-cinereo-lepidotae, floribus minutis. Calyx 5-dentatus, cupularis.

Bum. 799 Prov. Albay. — Herb. prop. 343, 344 Prov. Manila; 1387 Distr. Lepanto, Luzon.

Astronia Rolfei. (Melastomaceae.)

Arbor ramorum cortice albicante. Petioli 2-3 cm. glabri vel sparsim lepidoti. Folia e basi obtusa vel acutiuscula leviter cuneata, elliptico-ovata, acuminata, longa 10-20 cm. lata 4-8, praeter nervium submarginalem tenuem trinervia, nervis secundari prominentibus, subtus pallide ochraceo-lepidota evanescentia. Paniculae ochraceo lepidotae, floribus parvis. Calyx cupularis truncatus obscure denticulatus. Capsula globosa ore contracta.

— Cum. 1723. — Herb. prop. 1392 Viti, Prov. Albay. (N. v. Tognas-tognas). 174.

Parece especie bien distinta de las descritas y la dedico al botanico que ha cooperado á su revision.

Trichopleurum caudatum. (Araliaceae.)

Frutex vel arborea. Folia digitata. Petiolus communis 5-10 cm., petioluli 3-4 cm. Foliola saepius 7, e basi modice cuneata vel obtusata, sub-obliqua, elliptico-lanceolata, longe et abrupte acuminata (caudata), longa 10-15 cm. lata 3.5-4.0 mm. acumen vel cauda 2-3 cm., nervis arcuatis prope marginem coalitis, reticulatis, utrinque prominentibus. Paniculae racemosae, floribus in fasciculis umbellatis dispositis.

Styli liberi fructu coronantes. Fructus striato-sulcatus.
Cumm. 800 Prov. Tayabas. – Herb. prop. 793 Tivi, Prov. Albay.

Nauclea Blancoi. (Rubiaceae.)

Arbor. Ramuli teretes ad apicem complanati, rugoso-striati, fusci. Petioli 2-3 cm. rugosi, canaliculati. Folia e basi subrotundata vel in petiolo leviter decurrente interdum inaequalia, elliptico-lanceolata, longa 10-12 cm. lata 4-8 cm., glabra; nervi primarii laterales utrinque 8-10, sejunctim in axillis glanduliferi. Capitula terna, pedunculis validis, 3-4 cm. longis, majuscula, 4 cm. diam., stigmatis conico-capitatis.
Cumm. 890 Prov. Albay.

A esta especie me parece corresponder bien la descripcion de Nauclea glabra Blanco non Roxb., que no creo pueda referirse á Anthocephalus Cadamba Miq. ni por la inflorescencia (cabezuelas ternadas) ni por el fruto (cajillas separables).

175.

176.

Nauclea Cumingiana. (Rubiaceae.)

Arbor procera. Ramuli ad apicem complanati, rugosi, glabri vel puberuli. Petioli 5 mm. glabri vel pilosi. Folia e basi cordata vel semi-auriculata, oblongo-obovata, obtuse acuminata, longa 7-20 cm. lata 3-8 cm., glabrata nervis subtus pubescentibus, discolora-

subtus pallide virida vel ochracea; nervi primarii laterales utringue 7-9. Capitula 3 cm. diam. saepius terna, pedunculis validis, 3-5 cm. longis. Stigma capitatum.

Cum. 833 Prov. Tayabas; 1522 Prov. Batangas. — Herb. prop. 365. Centro de Luzon; 367 Isla de Samar.

Nauclea gracilis. (Rubiaceae.)

Arbor. Ramuli compressi canaliculati, graciles. Petioli brevis, 1-3 mm., vel subnulli. Folia e basi cuneata, oblongo-lanceolata vel lanceolata, obtuse acuminata vel subcaudata, longa 6-8 cm. lata 2-3 cm., glabra, concolora, in siccis brunnea, nervis 6-8 utringue, obliquis, reticulatis, prope marginem coalitis, margine revoluta. Capitula terminalia saepius solitaria, 15 mm. diam., densa, pedunculis gracilibus, 2-3 cm. Stigma capitatum longe exsertum.

Cum. 835 Prov. Ilbay.

Uncaria florida. (Rubiaceae.)

Frutex scandens ramis tetragonis, ramulis subteretibus glabris vel cum petiolis, pedunculis et nervis foliarum sparsim setosis. Stipulae ampliae bifidae, oratae, setosae, e basi auriculatae. Petioli brevis. 1 cm. Folia e basi

obtuso-rotundata, elliptico-ovata, abrupte acuminata, acumine obtutinsculo, longa 6-12 cm. lata 3-5 cm., glabrata vel sparsim pilosa. Bracteae circa apicem pedunculi, amplae, laciniatae, caducae. Capitula axillares, solitaria 176. 177. copiosa, pedunculis 3-4 cm. longis. Calyx villosus, lobis filiformibus. Corollae tubus capillaris, 1 cm. et ultra longus; lobi breves, rotundati, glabri. Capsulae pedicillatae, rostricosae, calycis lobis coronatae.

Cum. 862, 898 Prov. Albay; 1504 Prov. Batangas.

Esta especie y U. sclerophylla, Korb. son las que he visto mas frecuentes en el Centro y Sur de Luzon. Florece profusamente y de ahí el nombre.

Uncaria Hookeri. (Rubiaceae.)

Ramuli sub-teretes, dense ferrugineo-setoso-pilosi. Stipulae breves, 5 mm., bifidae, laciniatae. Petioli brevissimi vel subnulli. Folia e basi cordata, elliptico-ovata, longe obtuso-acuminata, longa 8-12 cm. lata 35-55 mm., pilosa, pilis albidis et ferrugineis intermixtis; nervi primarii laterales utringue 6-8. Capitula axillaria, 3 cm. diam., pedunculis dense vel densissime ferrugineo- vel cinereo-setoso-pilosis, 3-5 cm., bracteis brevibus, 4-5 mm., laciniatis, pilosis. Calyx setosus, lobis filiformibus dense setosis. Corolla extus villosa. Capsulae longe pedi-

cellatae, pedicellis hirtis, gracilibus. Capitula fructigera circa 6 cm. diametro.

Cum. 619, 1128 Prov. Albay. – Herb. prop. 1469 Pr. Bulacan.

Como observa Sir J.D. Hooker (Fl. Brit. Ind. III. p. 33) es muy afine á M. ferrea, DC.; pero se distingue bien desde luego por las estípulas y bráctеas mucho menores que en aquella. Nombro la especie por el primer botánico que ha dado sus caracteres diferenciales. 177.

178.

Mussaenda anisophylla. (Rubiaceae.)

Frutex vel arbuscula ramulis cum inflorescentia, petiolis et partibus novellis dense piloso-setosis. Stipulae lanceolato-acuminatae, dense setosae. Petioli oppositi saepissime inaequales: alius brevis alius longior, 1-7 cm. Folia e basi cuneata in petiolo decurrentia, elliptico-ovata, acuminata, in parem inaequilonga, longa 12-20 cm. lata 6-10 cm., subtus pallide glaucescentia, utrinque piloso-setosa praesertim subtus secus nervium medium. Flores in corymbis multifloris terminalibus bracteatis passim dichotomis. Calyx profunde fissus segmentis acute lanceolatis appendice foliaceo amplo, villoso-setoso praesertim petiolo.

Cum. 918 Prov. Albay.

Webera Cumingiana. (Rubiaceae.)

Frutex vel arbuscula ramulis angulatis cum partibus novellis rufo-villosis. Stipulae late triangulares, subulato-acuminatae, dense rufo-villosae. Petioli 1 cm. longi. Folia e basi leviter rotundata vel acutiuscula, elliptico-ovata, longa 10-15 cm. lata 5-8 cm., margine undulato-revoluta, supra aspera subtus praesertim in nervis villosa. Flores extus rufo-villosi, in cymis corymbosis ramis divaricatis, terminalibus, bracteatis, densis, pedunculis brevibus, 3-5 cm. Calyx truncatus breviter denticulatus. Corollae tubus 1 cm. et ultra longus, lobi 1/2-1/3 breviores. Ovarii loculi pluri-ovulati (sect. Euwebera Hook. f.). Fructus calyce coronatus, junior villosus.

Cum. 865. Prov. Albay. - Herb. Trop. 3773 Pr. Manila. 178.

179.

Webera luzoniensis. (Rubiaceae).

Frutex, vel arbuscula, ramulis angulato-canaliculatis, glabris vel tuberulis. Stipulae triangulares, caducae. Petioli 2-3 cm., puberulo-rugosi. Folia e basi cuneata, saepius sub-obliqua, elliptico-oblonga vel elliptico-ovata, longe et passim abrupte acuminata, longa 8-16 cm. lata 3-6 cm., nitida, glabra; nervi primarii laterales 8-10 utringue. Flores in cymis paniculatis, terminalibus, bracteatis, bracteis linearibus, pedunculis puberulo-tomentosis foliis brevioribus. Calyx 5 dentatus,

parvus, 2 mm., tomentosus. Corollae tubus brevis, calycem vix superans; lobi ½ mm. longi, puberuli vel glabri. Ovula in loculis solitaria (sect. Pseudoixora, Hook. f.). Bacca globosa, 5 mm. diam., nigra, 1-2-sperma, longiuscule pedicellata, 1 cm.

Cum. 1323 Prov. Albay. – Herb. prop. 1457 Prov. Manila.

Randia Cumingiana. (Rubiaceae.)

Frutex glaber ramulis inermibus. Stipulae interpetiolares, ovato-triangulares, apice subulatae, caducae, petiolo longitudine. Petioli 5 mm. Folia e basi cuneata passim inaequalia, oblonga vel oblongo-obovata, acuminata, longa 4-9 cm. lata 15-35 mm.; nervi primarii laterales utringue 4-6, in axillis glanduliferi. Flores albi in fasciculis oppositifoliis vel terminalibus corymbosis, paucifloris, bracteatis, bracteis subulatis vel subspinescentibus; pedicelli graciles, 5-10 mm., prope basim bibracteolati. Calycis tubus accrescens, marcescens vel circumscissus; dentes pilosi, subulati, tubo breviores. Corollae tubus gracilis, 15 mm.; lobi reflexi, angusti, tubo dimidio vel tertio breviores, in calyce fructifero usque 3 mm. longi. Bacca globosa, parva, 3 mm. diam., calyce coronata vel areolata. 179.

Cum. 1366 Prov. Albay. – Herb. prop. 39 Manila; 388 Calauan, Pr. Laguna.

Villaria littoralis. (Rubiaceae.)

Frutex, vel arbuscula, glaber, ramulis validis, sub-tere-
tibus complanatis, striatis. Stipulae ample triangulares,
petiolo equales vel longiores. Petioli breves, 5 mm., validi,
canaliculati. Folia e basi cuneata vel sub-rotundata,
ellipitica, apice abrupte obtuso-acuminata acumine breri,
longa 6-12 cm. lata 35-65 mm.; nervi primarii laterales
ad 12 utringue, in nervo arcternarginale coaliti, reticulati;
in vivo illis libri Aurantii similia. Cymae auxillares,
vel terminales corymbosae, foliis dimidio breriores, pe-
dunculis striatis, bracteatis, floribus 2-3 cm. longis.
Calyx 5 mm. longus, lobis rotundatis brevibus, ciliatis.
Corolla alba intus flaro maculata, crassiuscula, tubo
ampio, 3 mm. longo, lobis rotundatis tubo haud brerioribus.
Ovarium uniloculare, pluri-ovulatum. Bacca orata calyce
accrescente coronata, longa 20-25 mm. lata 15 mm., carnoso-
coriacea, virens, in maturitate perfecta nigricans.
Semina in placentis parietalibus plurima, compiarnata,
obovata, testa nigricante nitida, 3 mm. longa, hilo ba-
silare placentis affixa vel sub-immersa. Fructus et
semina illis Gardeniae sect. Leriscoides (verb. grat.
Gardenia obscura, Vid.) similes.

Cum. 874 Pr. Albay.

Villaria Rolfei. (Rubiaceae.)

Ramuli validi, subteretes, compl anati, glabri, pallidi. Stipulae amplae, triangulares, rotundatae, caducae. Petioli brevissimi vel subnulli. Folia e basi cuneata, obovata, apice 180 181 rotundata vel leviter emarginata, longa 7-12 cm. lata 50-70 mm., crassa, nitida, in siccis pallida, concolora; nervi primarii laterales 6-8 utringue. Cymae axillares, supra 6-8 florae, contractae, pedunculis brevibus, bracteatae, bracteis amplo-triangularibus, vaginantibus, ciliatis. Corollae tubus brevis, lobi stricte imbricati.

Cum. 1271 Prov. Albay.

R.A. Rolfe indica esta especie (l.c.), pero la sospecha, como la anterior, una forma robusta de su V. philippinensis. La siguiente clave puede ayudar á distinguir las tres que considero especies distintas:

1. { Hojas mas anchas en 1/3 superior. Infl. mas corta que 1/2 hoja — V. Rolfei.
   { Hoj. mas anchas en 1/2. Infl. mas cortas que 1/2 hoja. — 2.
2. { Hoj. elíptico-oblongas — V. philippinensis.
   { Hoj. elípticas — V. littoralis.

Canthium, arboreum. (Rubiaceae.)

Arbor robusta, inermis, ramis et ramulis patentibus, oppositis-decussatis, glabris, pallidis. Stipulae late rotundato-triangulares, marginatae, acumine longe subulato terminatae, persistentes vel aegre caducae. Petioli 10-15 mm., complanato-canaliculati. Folia e basi abrupte cuneata passim sub-obliqua, oblongo-lanceolata vel oblongo-ovata, obtuse acuminata, longa 10-15 cm. lata 5-7 cm.; nervi primarii laterales ascendentes, utringue 6-8, interdum in axillis glanduliferi. Flores parvi, pentameri, in cymis axillaribus; cymae foliis multo breviores, 1/4 vel minus, 181. 182. sacpissime dichotomae. Calyx truncatus obscure 5-denticulatus. Corollae luteae tubo sub-globoso sub-aequilongo, reflexae, acutiusculae; faux villosa.

Syn. Ronabea arborea, Blanco (Fl. Phil. 2.ª ed. 114.)

Cuming 776 Prov. Tayabas; 1554 Prov. Batangas.

Muy afine á Canthium mite, Bartl. en DC. Prodr. IV. 474, á juzgar por la breve diagnosis de DC. l. c., con cuya especie lo identifica Fernandez Villar en Novisc. Asp. pág. 116; pero se observan diferencias en forma hojas, longitud inflorescencias y cáliz. Bueno será, sin embargo, cotejar los ejemplares de Cuming con los auténticos de Haenke (Herb. Praga, Viena y Munich) para fijar mejor aquellas ó refundir la especie de Blanco en la de Bartling.

Canthium Villarii. (Rubiaceae.)

Frutex, vel arbuscula, inermis, ramulis sub-teretibus, pallidis, rugoso-striatis. Stipulae late rotundato-triangulares, marginatae, caducae. Petioli brevis, 5 mm., canaliculati. Folia e basi cuneata in petiolo decurrente, elliptico-oblonga vel elliptico-obovata, apice breviter obtuse acuminata, margine sub-revoluta, longa 5-7 cm. lata 30-35 mm.; nervi primarii laterales 4-6 utrinque, in axillis saepius glanduliferi. Flores minuti, pentameri in umbellis axillaribus foliis multo brevioribus; pedunculus communis petiolo paulo longior. Calyx truncatus, 5-denticulatus, Corolae tubus calycem parum superans; lobi reflexi acutiusculi.

Cum. 886 Prov. Albay; 1327 Prov. Batangas? — Herb. prop. 395 Laguimanoc, Pr. Tayabas. 182 183. Difiere del C. umbellatum, Wight, con el que lo identifica Fernandez Villar (Novis. Ofyc. pág. 110), en su general aspecto, todas sus partes menores y mas delgadas, en la forma de las hojas, cáliz etc.; pero es siempre la especie señalada por nuestro sábio amigo la que llamamos mas próxima.

Ixora Cuningiana. (Rubiaceae.)

Arborea, glabra, ramulis striatis. Stipulae brevis,

latae, longe subulatae. Petioli 5-15 mm. longi, rugosi, canaliculati? Folia e basi rotundata leviter cuneata, oblonga, obtuse acuminata, longa 7-15 cm. lata 30-55 mm.; nervi primarii laterales utrinque 8-12. Cymae trichotomae corymbosae longe pedunculatae, pedunculo 4-8 cm., foliis sub-aequales vel longiores, pedunculis divisis, bracteatis, bracteis linearibus. Calyx cupularis acutiuscule 5-dentatus, dentibus ovario brevioribus, parvis, 2 mm. Corolae tubus filiformis, 10-15 mm., lobi angusti reflexi tubo ½ aut ⅓ breviores.

Leyte 895, 1233 Prov. Albay; 1566 Prov. Batangas ó Isla Mindoro?

Pavetta parvifolia. (Rubiaceae.)

Frutex glaber ramis pallidis, rugoso-lenticellatis, ramulis teretibus, striatis. Stipulae vaginantes, amplae, rotundae, scariosae, caducae. Petioli brevissimi vel subnulli. Folia e basi cuneata, oblongo-obovata, apice rotundata vel obtuse acuminata, longa 1-5 cm. lata 5-20 mm., glabra vel praesertim ad nervos subtus pilosula. Flores breviter pedicellati in cymis axillaribus vel terminalibus fasciculatis vel corymbosis, pilosis, breviter pedunculatis. Calyx denticulatus, dentibus ovario brevioribus. 183.-184. Corollae tubus filiformis calycem longe superans, longus 2 cm.

lobi reflexi tubo dimidio breviores.
Cumm. 1394 Prov. Albay? — Herb. prop. 380.

Morinda Cumingiana. (Rubiaceae.)
Frutex alte scandens ramis et ramulis sinuosis striatis; ramis glabris, ramulis saepissime puberulis. Stipulae connatae, vaginantes, scariosae, apice truncatae. Petioli breves, 5 mm., vel sub-nulli. Folia e basi acuta, cuneata, apice rotundata vel sub-emarginata, mucronata, circa apicem latiora, longa 4-6 cm. lata 20-25 mm., glabra; nervi primarii laterales utrinque 4-5, minute reticulati, subtus prominentes. Umbellae 4-10 radiatae capitula densa, 5-10-flora, ferentes, floribus sessilibus. Calyx cupularis, truncatus, obscure denticulatus, 3 mm. longus. Corollae tubus calyce duplo vel triplo longior, lobi tubo breviores vel sub-aequales, saepissime 4, apice obtusi.
Cumm. 1242 Prov. Albay.

Gaultheria Cumingiana. (Ericaceae.)
Fruticulus ramis teretibus interdum sinuosis, glabris vel puloso-setosis. Petioli sub-nulli incrassati. Folia e basi rotundata vel sub-cordata ovata vel

lanceolata - ovata, longe obtuso-acuminata, apice saepissime calloso, longa 2-3 cm. lata 1-2 cm., prope basim lata, inaequaliter spinuloso-serrata vel calloso-serrata, glabra vel praesertim subtus ad nervos adsperse setosa, saepissime ciliata. Alabastra globosa. Flores parvi, 3-5 mm., in racemis axilaribus; bracteae ciliatae, bracteolae ad apicem pedicellorum 184. 185. calycis segmenta ovata, triangulares, mucronata, ciliolata. Corolla ovato-campanulata, lobis rotundatis saepissime reflexis. Antherarum loculi apice biaristati. Capsula globosa, 4-7 mm. diam.; calyce succulento, nigro-caeruleo inclusa. Semina numerosa, angulato-cuneata, testa nitida refulgente.

Cum. 934 - Prov. Albay. - Herb. Trop. 818 Volcan Mayon, Prov. Albay; 1829 Distr. Lepanto.

Jasminum luzoniense. (Oleaceae.)

Frutex scandens ramis teretibus, glabratis vel puberulo-tomentosis, ramulis cum [illegible] et bracteis [illegible] tomentosis, tomento stellato, griseo-ochraceo. Petioli breves, 5-10 mm. Folia simplicia, elliptica obtusa vel breviter cuneata, passim sub-obliqua, oblongo-lanceolata vel ovato-lanceolata, acuminata, 5-10 cm. longa 2-4 cm. lata, superiora minora bracteis similia, adulta glabrata

vel sparsim punctato-villosa. Cymae corymbosae densae, axillares vel terminales, breves, bracteatae, multiflorae. Calycis dentes, 2-3 mm. longi, subulati, saepissime recurvi, communiter 6-8. Corollae tubus gracilis, 1 cm.; lobi tubo breviores, saepissime 6-8, apice rotundati aut acutiusculi. Flores albi. Bacca simplex, globosa, 5 mm. diam. aut paullum ultra, dentes calycis fructiferis parum superans vel subaequalis, nitida, nigra, monosperma.

Cum. 1029 Prov. Albay. — Herb. prop. 1135 Pr. Zambales; 1575, 1576 Distr. Zepanto (N.v. Singitan).

Linociera cunningiana. (Oleaceae.)

Arbuscula glabra ramulis sub-teretibus, pallidis, lenticellatis. Petioli 2-4 cm. complanati. Folia e basi cuneata in petiolo decurrentia, elliptico-oblonga, acuminata vel saepius abrupte acuminata, longa 8-12 cm. lata 35-50 mm.; nervi primarii laterales utrinque 10-12, prominentes, reticulati; saepius punctata. Flores in paniculis axillaribus, brevibus, petiolo parum longioribus, minuti, 2-3 mm. Bracteae minutae. Calyx glaber lobis [illegible] Petala concava, apice leviter infexa, basi per paria cohaerentia. Drupa ovoidea, 1 cm. longa, nigra. Semina albumine corneo.

Cum. 972 Prov. Albay. — Herb. prop. 1573.

Wrightia Candollei. (Apocynaceae.)

Arbor procera l'gno [illegible] ramulis lenticellatis, pubescentibus. Petioli breves, 5 mm. Folia e basi acutiuscula, elliptica, passim abrupte obtuso-acuminata, longa 6-10 cm. lata 3-5 cm., supra sparsim subtus dense tomentosa, in nervis setoso-pilosa, tomento saepissime griseo; nervi primarii laterales ad 12 utrinque cum reticulatione subtus prominentes. Cymae pauciflorae, subaxillares vel terminales, breviter pedunculatae, bracteatae, pedunculis et bracteis piloso-setosis. Calyx pilosus, 5 mm. longus, lobis rotundatis, ciliatis, persistentibus. Corolla albo-rosea, in fundo intense colorata, expansa 3 cm., diam., tubo calycem parum superante; appendices ante lobos corollae ellipticae crenatae lobo multo breviores, glabrae carnosulae, interfectis dentibus brevioribus alternis (A. de Candolle; Prodr. VIII. 405); antherae pilosae. Folliculi coalescentes, semiteretes, ad basim angustiores, apice acuminati, 30-40 cm. longi, lenticellati.

Cum. 1450' Prov. Batangas. 186.

Affine W. pubescens, R. Br., separándola bien los caracteres diferenciales observados por A. de Candolle (l.c.).

Cordia Cumingiana. (Boragineae.)

Arborea ramis tomentoso-scabris, tomento fulvo vel cinereo, ramulis densse tomentosis. Petioli 2-11 cm. Folia e basi rotundata sub-cordata, ovata, acuminata, longa 5-15 cm. lata 2-8 cm., irregulariter sub-crenata aut sub-integerrima, supra villoso-scabra subtus tomentoso-velutina cinerea vel fulvo-ferruginea; basi obscura trinervia; nervi primarii laterales utrinque 5-8. Corymbi terminales vel axillares saepissime dichotomi; flores albi, sessiles, glomerati. Calyx cupularis in alabastro clausus, in fructu patelliformis, 10-striatus, 5-denticulatus, 3-5 mm. longus, densse fulvo-tomentosus. Corollae tubus calyce sub-aequalis; lobi reflexi, tubo [illegible] breviores, acutiusculi. Bacca pedicellata, calycem fructiferum duplo, aut ultra superans, conico-ovata, 1 cm. longa, nitens, nigra; abortu monosperma.

Cum. 1012 Prov. Abay ó Camarines? — Herb. prop. 1647 Prov. Abra; 1653 Sabi Mateo, Prov. Manila.

Callicarpa-micrantha. (Verbenaceae.)

Frutex vel arbuscula ramulis tuberculis aut-illosis ochraceis. Petioli brevissimi, 2-3 mm., vel sub-nulli. Folia e basi cuneata, oblonga vel oblongo-elliptica, acuminata, longa 3-5 cm. lata 10-15 mm., crenato-

serrata praeter acuminem saepissime sub-integrum, supra sparsim subtus dense ochraceo-pilosa, pilis stellatis. Cymae dichotomae vel trichotomae, axillares, graciles, foliis breviores, pedunculis sparsim stellato-pilosis aut glabratis, bracteis et bracteolis linearibus, floribus minutis, expansis 2-3 mm. Calyx truncatus, v. denticulatus, 1-2 mm. longus, villoso-punctatus. Corollae tubus calycem parum superans. Bacca parva, 2-3 mm., globosa vel depresso-globosa, nigro-caerulescens.

Cum. 1165 Prov. Albay. - Herb. prop. 1641 Prov. Abra.

187. 188.

188.

Malvaceae, subfam. Bombaceae. 211.

Cumingia, Vid. gen. nov.

Calyx campanulatus irregulariter lobatus, lobis saepius 3-margine plus minusve erosis, involucello (epicalyce) ei simili duplo-vel triplo breviore cinctus. Petala 5, imbricata, quincunciale obtegentia, in annulum basi-larem breve coalita, ac basin intus dense villosa, dorso praeter marginem lepidota, pelurinervia, marces-centia. Stamina filamentis in tubum alte connatis, tubo stamineo petalis breviore ad apicem in phalanges, saepissime 5, divisa, plerumque 4-antheriphora, antheris uniloculatibus, adnatis, oblongo-orbicularibus, con-nectivo postice dilatato, longitudinaliter extrorsum dehiscentibus. Pollen muriculatum. Ovarium sessile, biloculare (an semper?), loculis uniovulatis; stylus columnaris tubum stamineum superans, in ramos 2, raro 3-4, stigmatiferos plus minusve profunde divisus; stigmata discoidea, subtriloba, lobis crassis. Capsula calyce et epicalyce auctis cincta, obovata, apice depressa mucronulata, biloculari (an semper?), 2-1 sperma, loculicide bivalvis, valvis usque ad basin secedentibus, septatis. Semina dense lanata, testa rugoso-sulcata, exalbuminata; cotyledones induplicato-convolutae. — Folia sparsa, raro

ramulorum saepius conferta, lepidota, basi subtrinervia. Flores cymosi, bracteolati, inflorescentia calycibusque lepidotis. 211.

212.

Cunninghamia philippinensis, Vid. sp. unica.

Arbor cortice albicante, ramis teretibus, ramulis lepidoto-puberulis, superne interdum striato-angulatis. Petioli 2-3 cm. longi, dense lepidoti, rugosi, cicatricem amplam, sub-orbicularem relinquentes. Folia e basi cuneata vel rotundata, leviter peltata interdum sub-obliqua, obovata-oblonga vel obovata, apice obtusa vel emarginata, 4-8 cm. longa 25-40 mm. lata, integerrima undulata rarius irregulariter sub-crenata, in vivo crassiuscula, juniora utringue lepidota adulta supra squamarum orbicularium impressionibus notata, saepius glaucescentia interdum subtus fuscicantia; nervi primarii laterales 6-8 utringue, inferiores sub angulo acuto ascendentes ceteri sub-patuli, ante marginem arcuato-coaliti, supra prominuli subtus saepius obsoleti. Cymae saepissime umbelliformes, axillares, 3-6 florae, pedunculis striato-angulatis, reticulo brevi-ramuloso fructiferis longioribus, floribus brevissime pedicellatis, pedicellis articulatis, basi 1-bracteolatis, bracteola parva deciduca, expansis 1-cm. diam., petalis calycem duplo superantibus. Capsula 10-15 mm. longa 5-7

mm. lata, dense lepidota.

Synonymia. – Neesia altissima, A. Vill. non. Blume, Novisz. Append. 356.

Hab. – In littoribus limosis Luzoniae non frequens. Herb. Prop. 653, 1170 Luisan Prov. Tayabas (N. v. Bitato puti) – Bastilla Prov. Albay.

Nuestro género es muy parecido al Camptostemon de Masters (Hooker's Icones plantarum vol. XII, 3. ser. vol. II, 18 t. 1119); pero las anteras unilobulares le separan bien de aquel. 212. 213.

En el Genera plantarum de Bentham y Hooker debe seguir á Neesia, Blume (Malvaceae 38).

Caido, con plena justificacion, el género Lasiopetalum de Don (V. Benth. & Hook. f. l. c. III. 679) en la sinonimia de Lasianthera, Ruiz & Pav. no creo que pueda objeccion fundada contra su nominacion estrictamente sujeta á lo prescrito en el art. 28, párrafo 9.° de las Leyes de nomenclatura adoptadas por el Congreso botánico de París en 1867, siendo familias bien distantes las Malvaceas (Dicotiledoneas) y las Hemadoraceas (Monocotiledoneas), así no vacilo en dedicarlo al benemérito colector cuyos trabajos en Filipinas son el fundamento de este opúsculo.

Nos. 1 - 132 collected in Jan. & Feb. 1903.